

Salons de Montpellier 2013, 2014 et 2015 - Liste des espèces identifiées (427)

Genre	Espèce	Synonyme	Auteurs	Nom vernaculaire
<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>		(Bulliard:Fr.) Singer	
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>		Jac.Schäffer, ss Lange, non ss Cooke ni ss Ricken	
<i>Agaricus</i>	<i>bresadolanus</i>	<i>Syn. Agaricus romagnesii</i>	Bohus	Agaric de Bresadola
<i>Agaricus</i>	<i>haemorrhoidarius</i>		Schulzer, ss Möller, non ss Lange	
<i>Agaricus</i>	<i>menieri</i>		Bon	Agaric des dunes
<i>Agaricus</i>	<i>phaeolepidotus</i>		(Møller) Møller	Agaric à écailles sombres
<i>Agaricus</i>	<i>silvicola</i>		(Vittadini) Peck	
<i>Agaricus</i>	<i>variegans</i>		Møller	
<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	<i>Syn. Agaricus xanthoderma</i>	Genevier	Psallote jaunissante
<i>Agrocybe</i>	<i>cylindracea</i>	<i>Syn. Agrocybe aegerita</i>	(DC.: Fr) Maire	Pholiote du peulier
<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>		(Pers.:Fr.) Fuckel	Pézize orangée
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>		(Jac.Schäffer) Pers.	Amanite citrine
<i>Amanita</i>	<i>junquillea</i>	<i>Syn. Amanita gemmata</i>	Quélet	Amanite jonquille
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		(L.:Fr.) Lamarck	Amanite tue-mouches
<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>		(Bulliard:Fr.) Link	Amanite ovoïde
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>		(DC.:Fr.) Krombholz	
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>		(Fr.:Fr.) Link	Amanite phalloïde
<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>		Albertini et Schweiniz : Fr.	Amanite porphyre
<i>Amanita</i>	<i>proxima</i>		Dumée	
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>		Pers.:Fr.	Amanite rougissante
<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>		(Bon) Gröger	Amanite à volve grise
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>		(Bulliard:Fr.) Lamarck	Amanite vaginée
<i>Ampulloclitocybe</i>	<i>clavipes</i>	<i>Syn. Clitocybe clavipes</i>	(Pers.:Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys	Clitocybe à pied en massue
<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>		(Vahl:Fr.) Kummer	Armillaire couleur de miel
<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>		(Romagnes) Herink	Armillaire d'Ostoya
<i>Armillaria</i>	<i>socialis</i>	<i>Syn. Armillaria tabescens</i>	(DC./Fr.)Fayod	
<i>Armillaria</i>	<i>sp.</i>			
<i>Astraeus</i>	<i>hygrometricus</i>		(Pers.:Pers.) Morgan	Astrée hygrométrique
<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>		(Bulliard:Fr.) Wettstein	
<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>		(Willdenow:Fr.) Karsten	Tramete brulée
<i>Boletinus</i>	<i>cavipes</i>		(Klotzsch ex Fr.) Kalchbrenner	Bolet à pied creux
<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>		(Paulet) Fr	Cèpe d'été
<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>		Pers.:Fr.	
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>		Bulliard:Fr.	Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>		Pers.:Fr.	Bolet à pied rouge
<i>Boletus</i>	<i>impolitus</i>		Fr.	
<i>Boletus</i>	<i>lupinus</i>		Fr., ss Romagnesi, non ss Bresadola	
<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>		Jac.Schäffer:Fr.	
<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>		Pilát et Dermek	Cèpe des pins
<i>Boletus</i>	<i>queletii</i>		Schulzer	
<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>		(Krombholz) Kallenbach	
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	Calocère visqueuse
<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>		(Scopoli:Pers.) Perdeck	
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>		Fr.:Fr.	
<i>Cantharellus</i>	<i>ferruginascens</i>		Orton	Girole ferrugineuse
<i>Cerocorticium</i>	<i>molare</i>		(Chaillat ex Fr.:Fr.) Jülich et Stalpers	
<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>		(Bulliard:Fr.) Bataille	Bolet poivré
<i>Chamaemyces</i>	<i>fracidus</i>		(Fr.) Donk	Lépiote guttulée
<i>Chlorophyllum</i>	<i>brunneum</i>	<i>Syn. Macrolepiota venenata</i>	(Farlow et Burt) Vellinga	Lépiote vénéneuse
<i>Chlorophyllum</i>	<i>rhacodes var. bohémica</i>	<i>Syn. Macrolepiota rhacodes</i>	(Vittad.)Vellinga	Lépiote déguenillée
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Miller	Gomphide rutilant
<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>		Micheli : Pers	Clathre rouge, cœur desorcière
<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>		(L.:Fr.) Donk	Clavaire en massue, clavaire en pilon
<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>		(Quélet) Donk	Clavaire tronquée
<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>		(Bulliard:Fr.) Schröter	Clavaire cendrée
<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	<i>Syn. Clavulina cristata</i>	(L.:Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe</i>	<i>candicans</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe blanchissant
<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>		Kühner et Romagnesi	Clitocybe cotelé
<i>Clitocybe</i>	<i>decembris</i>		Singer	
<i>Clitocybe</i>	<i>ditopa</i>		(Fr.:Fr.) Gillet	
<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>		(Withering:Fr.) Kummer	Clitocybe anisé strié
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	
<i>Clitocybe</i>	<i>inornata</i>		(Sowerby:Fr.) Gillet	
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>		(Batsch:Fr.) Kummer	Clitocybe nébuleux
<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer	Clitocybe anisé

<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe des feuilles
<i>Clitocybula</i>	<i>lenta</i>		(Maire) Malençon et Bertault	
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>		(Scopoli:Fr.) Kummer	
<i>Coprinellus</i>	<i>disseminatus</i>	<i>Syn. Coprinus disseminatus</i>	(Pers.:Fr.) J.E. Lange	Coprin grégaire, coprin disséminé
<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	<i>Syn. Coprinus micaceus</i>	(Bulliard:Fr.) Vilgaly et coll.	Coprin micacé
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>		(O.F.Müller:Fr.) Pers.	Coprin chevelu
<i>Cortinarius</i>	<i>aleuriusmus</i>		R.Maire, ss Henry, Moser, non ss Lange	
<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>		R. Henry ex P.D. Orton	
<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>argutus var. fraudulosus</i>		(Britzelmayr) Melot	
<i>Cortinarius</i>	<i>azureovelatus</i>		Orton	
<i>Cortinarius</i>	<i>bivelus</i>		(Fr.:Fr.) Fr., ss Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>caerulescens</i>		(Jac.Schäffer) Fr.	Cortinaire bleu
<i>Cortinarius</i>	<i>caligatus</i>		Malençon	Cortinaire chaussé
<i>Cortinarius</i>	<i>calochrous</i>		(Pers.:Fr.) Gray, ss Lange, non ss Cooke	
<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>		(Fr.) Fr.	Cortinaire camphré
<i>Cortinarius</i>	<i>caperatus</i>	<i>Syn. Rozites caperatus</i>	(Pers.:Fr.) Karsten	Pholiote ridée
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>		(L.:Fr.) Gray	Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>		(L.:Fr.) Gray	
<i>Cortinarius</i>	<i>cotoneus</i>		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>diosmus</i>		Kühner	
<i>Cortinarius</i>	<i>duracinus</i>		Fr.	Cortinaire à pied dur
<i>Cortinarius</i>	<i>fulvoochrascens</i>		Henry inval., non ss Moser 1960	
<i>Cortinarius</i>	<i>gentianeus</i>	<i>Syn. Cortinarius amarescens</i>	Bidaud	
<i>Cortinarius</i>	<i>herculeus</i>		Malençon	Cortinaire herculéen
<i>Cortinarius</i>	<i>hillieri</i>		Henry	
<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	Cortinaire à marge brisée
<i>Cortinarius</i>	<i>lebretonii</i>		Quélet	
<i>Cortinarius</i>	<i>malicorius</i>		Fr., ss Fr., non ss Quélet	
<i>Cortinarius</i>	<i>mucifluoides</i>		Henry	
<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>		(Fr.->) Fr., non ss Ricken ni Brandud	
<i>Cortinarius</i>	<i>nemorensis</i>	<i>Syn. Cortinarius varicolor</i>	Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>ochroleucus</i>		(Jac. Schäffer:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>percomis</i>		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>prasinus</i>		(Jac. Schäffer:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>rapaceus</i>		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>renidens</i>		Fr., ss Fr., non ss Cooke	
<i>Cortinarius</i>	<i>rickenii</i>		Henry ex Bidaud, Moëgne-Loccoz et Reumaux	
<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>		(Fr.:Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin
<i>Cortinarius</i>	<i>sordescens</i>		R. Henry	
<i>Cortinarius</i>	<i>splendificus</i>		Chevassut et Henry	Cortinaire éclatant
<i>Cortinarius</i>	<i>suillus</i>		Fr.	Cortinaire des porcs
<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>triformis</i>		Fr., ss Ricken, Lange	
<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis f. fuscus</i>		Lange	Cortinaire trivial
<i>Cortinarius</i>	<i>turgidus</i>		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>		(L.:Fr.) Fr., non ss Jac.Schäffer	
<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>		(L.:Fr.) Pers.	Trompette-des-morts
<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	
<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	<i>Syn. Cantharellus tubiformis</i>	(Fr.:Fr.) Quélet	Chanterelle en tube
<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>		(Hudson) Kambly	
<i>Cudonia</i>	<i>circinans</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	
<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>		(Scopoli) Fayod	Cystoderme furfuracé
<i>Cystoderma</i>	<i>carcharias</i>		(Pers. : Fr) Fayod	Cystoderme dents-de-requin
<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>		(L.:Fr.) Pers.	
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>		(Bolton:Fr.) Schröter	Tramete rougissante
<i>Daedaleopsis</i>	<i>tricolor</i>		(Bulliard:Fr.) Bondartsev & Singer	
<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>		(Kühner et Romagnesi) Kubicka	
<i>Entoloma</i>	<i>politum</i>		(Pers.:Fr.) Donk	
<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	
<i>Flammula</i>	<i>pinicola</i>	<i>Syn. Pholiota pinicola</i>	Jacobsson	Flammule des pins
<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>		(L.:Fr.) Fr.	Amadouvier
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>		(Swartz:Fr.) Kickx	Polypore marginé
<i>Funalia</i>	<i>gallica</i>		(Fr.) Bondartsev & Singer	
<i>Ganoderma</i>	<i>applanatum</i>	<i>Syn. Ganoderma lipsiense</i>	(Schaeff.) With.	Ganoderme plat
<i>Ganoderma</i>	<i>carosum</i>		Patouillard	
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>		(W.Curtis:Fr.) Karsten	Ganoderme luisant

<i>Ganoderma</i>	<i>resinaceum</i>		Boudier	
<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>	<i>Syn. Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar	Geastre sessile
<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>		Junghuhn	
<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	<i>Syn. Gloeophyllum saepiarium</i>	(Wulfen:Fr.) Karsten	Lenzite des clôtures
<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Fr.	
<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>		(Fr.:Fr.) Murrill	Gymnopile pénétrant
<i>Gymnopilus</i>	<i>picreus</i>		(Pers.:Fr.) Karsten	
<i>Gymnopilus</i>	<i>spectabilis</i>		(Fr.) Singer	Gymnopile remarquable
<i>Gymnopus</i>	<i>brassicolens</i>	<i>Syn. Micromphale brassicolens</i>	(Romagn.) Antonin & Noordel	Marasme à odeur de chou
<i>Gymnopus</i>	<i>confluens</i>	<i>Syn. Collybia confluens</i>	(Pers.:Fr.) Antonin, Halling & Noordel	Collybie en touffes
<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>	<i>Syn. Collybia fusipes</i>	(Bulliard:Fr.) Gray	Collybie à pied en fuseau
<i>Gymnopus</i>	<i>peronatus</i>	<i>Syn. Collybia peronata</i>	(Bolton:Fr.) Antonin, Halling & Noordel	Collybie guêtrée
<i>Gyromitra</i>	<i>infula</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Quélet	Gyromitre en turban
<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	Bolet châtain
<i>Hebeloma</i>	<i>angustispermum</i>	<i>Syn. Hebeloma cylindrosporium</i>	A. Pearson	
<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>		(Bulliard) Quélet	
<i>Hebeloma</i>	<i>laterinum</i>	<i>Syn. Hebeloma edurum</i>	(Batsch) Vesterh	Hébélome Bele-Hélène, Tante à Nanon
<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>		(Bulliard:Fr.) Ricken	Hébélome radicant
<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>		(Paulet) Sacc.	Hébélome échaudé
<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>		(Scopoli:Fr.) Fr.	Helvelle crépue
<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>		Afzelius:Fr.	Helvelle en selle
<i>Helvella</i>	<i>macropus</i>		(Pers.:Fr.) Karsten	Helvelle à long pied
<i>Heterobasidion</i>	<i>annosum</i>		(Fr.:Fr.) Brefeld	
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>geogenia</i>		(DC.) Singer	
<i>Hydnellum</i>	<i>aurantiacum</i>		(Batsch:Fr.) Karsten	
<i>Hydnellum</i>	<i>caeruleum</i>		(Horneman) Karsten	Hydnelle bleu
<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>		(Pers.) Banker	
<i>Hydnellum</i>	<i>ferrugineum</i>		(Fr.:Fr.) Karsten	Hysnelle à pied spongieux
<i>Hydnum</i>	<i>albidum</i>		Peck	
<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>		L.:Fr., non ss Bolton	
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>		Pers.:Fr.	Hydne rougissant
<i>Hygrocybe</i>	<i>chlorophana</i>		(Fr.:Fr.) Wünsche	Hygrocybe jaune soufre
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>		(Jac. Schäffer:Fr.) Kummer	Hygrophore conique
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>		(Wulfen:Fr.) Maire	Fausse girofle
<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>		(Fr.) Fr.	Hygrophore à odeur agréable
<i>Hygrophorus</i>	<i>chrysodon</i>		(Batsch:Fr.) Fr.	Hygrophore à dents jaunes
<i>Hygrophorus</i>	<i>discoanthus</i>		(Fr.) Rea	Hygrophore à disque jaune
<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>		(Bulliard:Fr.) Fr.	Hygrophore blanc ivoire
<i>Hygrophorus</i>	<i>hypothejus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Hygrophore jaunissant
<i>Hygrophorus</i>	<i>latitabundus</i>		Britzelmayer	Hygrophore limace
<i>Hygrophorus</i>	<i>lucorum</i>		Kalchbrenner	Hygrophore des mélèzes
<i>Hygrophorus</i>	<i>nemoreus</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	Hygrophore des bois
<i>Hygrophorus</i>	<i>penarius</i>		Fr.	
<i>Hygrophorus</i>	<i>pudorinus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Hygrophore pudibond
<i>Hygrophorus</i>	<i>russula</i>		(Pers.) Wünsche	Hygrophore russule
<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Hypholome à lames grises
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>		(Hudson:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes
<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	<i>Syn. Hypholoma sublateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	Hypholome couleur de brique
<i>Hypholoma</i>	<i>marginatum</i>		(Pers.:Fr.) Schröter	Hypholome disséminé
<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>		(Weinmann) Quélet	Inocybe à odeur de Benjoin
<i>Inocybe</i>	<i>cookei</i>		Bresadola	
<i>Inocybe</i>	<i>corydalina</i>		Quélet	Inocybe à mamelon vert
<i>Inocybe</i>	<i>curvipes</i>		Karsten	Inocybe variable
<i>Inocybe</i>	<i>decipiens</i>		Bresadola	
<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>		(Alb. & Schw.) Kummer	Inocybe doux amer
<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>		(Pers.: Fr) P. Kumm	Inocybe à odeur de poire
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i> var. <i>lilacina</i>		(Peck) Gillet	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe</i>	<i>godeyi</i>		Gillet	Inocybe de Godey
<i>Inocybe</i>	<i>griseolilacina</i>		Lange	Inocybe gris lilas
<i>Inocybe</i>	<i>haemacta</i>		(Berkeley et Cooke) Saccardo	Inocybe rouge et vert
<i>Inocybe</i>	<i>hirtella</i>		Bresadola	Inocybe à odeur d'amande amère
<i>Inocybe</i>	<i>jurana</i>		(Patouillard) Saccardo	
<i>Inocybe</i>	<i>posterula</i>	<i>Syn. Tricholoma xanthodisca</i>	(Britzelmayer) Saccardo	Inocybe tardif
<i>Inocybe</i>	<i>pudica</i>		Kühner	Inocybe pudique
<i>Inocybe</i>	<i>umbrina</i>		Bresadola	
<i>Inonotus</i>	<i>hispidus</i>		(Bulliard:Fr.) Karsten	
<i>Inonotus</i>	<i>tamaricis</i>		(Patouillard) Maire	

<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	<i>Syn. Lasiochlaena benzoina</i>	(Wahlenberg:Fr.) M. Bon	Polypore balsamique
<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>		(Fr.:Fr.) Singer et A.H.Smith	
<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>		Cooke	Laccaire améthyste
<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>		(Maire) Orton	
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>		(Scopoli:Fr.) Cooke	Laccaire laqué
<i>Lacrymaria</i>	<i>lacrymabunda</i>	<i>Syn. Psathyrella lacrymabunda</i>	(Bulliard:Fr.)Pat	Psathyrelle veloutée
<i>Lactarius</i>	<i>albocarneus</i>		Britzelmayr	Lactaire glutineux
<i>Lactarius</i>	<i>atlanticus</i>		Bon	Lactaire des chênes verts
<i>Lactarius</i>	<i>aurantiofulvus</i>		Blum ex Bon	Lactaire fauve orange
<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>		(Bulliard:Fr.) Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>		Fr.	Lactaire à lait jaunissant
<i>Lactarius</i>	<i>controversus</i>		Pers.:Fr.	Lactaire renversé
<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>		(L.:Fr.) Gray, non ss Lange	Lactaire délicieux
<i>Lactarius</i>	<i>determinus</i>		Gröger	
<i>Lactarius</i>	<i>fluens</i>		Boudier	
<i>Lactarius</i>	<i>fuliginosus</i>		(Fr.:Fr.) Fr., ss Quélet, Kühner et Romagnesi	
<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>		(Fr.:Fr.) Fr., ss Lange, non ss Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>lignyotus</i>		Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>necator</i>		(Bulliard:Fr.) Pers.	Lactaire plombé
<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>		Pers.:Fr., non ss Saccardo	
<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>		Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>quieticolor</i>		Romagnesi	Lactaire gris orangé
<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire tranquille
<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>		(Scopoli:Fr.) Fr.	Lactaire roux
<i>Lactarius</i>	<i>rugatus</i>		Kühner et Romagnesi Kühner et Romagnesi	
<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>		(Paulet) Fr.	Lactaire sanguin
<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>		(Pers.:Fr.) Gray	Lactaire caoutchouc, lactaire presque doux
<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire velouté
<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>		(Bulliard) Fr.	Lactaire zoné
<i>Laetiporus</i>	<i>sulphureus</i>		(Bulliard:Fr.) Murrill	
<i>Laricifomes</i>	<i>officinalis</i>		(Villars:Fr.) Kotlaba et Pouzar	
<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>		(Bulliard) Gray	
<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>		(Bulliard:Fr.) Gray	
<i>Lenzites</i>	<i>wamieri</i>		Durieu et Montagne	
<i>Lepiota</i>	<i>alba f. ochraceodisca</i>			(Bon)
<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>		(Bolton:Fr.) Kummer	Lépiote crépue
<i>Lepiota</i>	<i>kuehneri</i>		Huijsman ex Hora	
<i>Lepiota</i>	<i>ventriosopora</i>		Reid	
<i>Lepista</i>	<i>fiaccida</i>		(Sowerby:Fr.) Patouillard , non ss Bresadola	
<i>Lepista</i>	<i>glaucocana</i>		(Bresadola) Singer	
<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>		(Scopoli) Patouillard	Clitocybe inversé
<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>		(Bulliard:Fr.) Cooke	Pied bleu
<i>Lepista</i>	<i>panaeola</i>		(Fr.) Karsten, non ss Karsten	
<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>		(Vittadini) Wasser	Lépiote pudique
<i>Leucocortinarius</i>	<i>bulbiger</i>		(Albertini et Schweiniz:Fr.) Singer	
<i>Leucopaxillus</i>	<i>cutefractus</i>		Noordeloos	Leucopaxille craquelé
<i>Leucopaxillus</i>	<i>gentianeus</i>	<i>Syn. Leucopaxillus amarus</i>	(Quélet) Kotlaba	Leucopaxille amer
<i>Leucopaxillus</i>	<i>giganteus</i>		(Leysser:Fr.) Singer	
<i>Leucopaxillus</i>	<i>paradoxus</i>		(Constantin & Dufour) Bours.	Leucopaxille à odeur de poulailler
<i>Limacella</i>	<i>glioderma</i>		(Fr.) Maire	
<i>Lycoperdon</i>	<i>echinatum</i>		Pers.:Pers.	
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>		Pers.:Pers.	Vesse de loup
<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>		(Fr.:Fr.) Singer	Tricholome en touffes
<i>Lyophyllum</i>	<i>fumosum</i>		(Pers.:Fr.) Kühner ex Orton	Tricholome enfumé
<i>Lyophyllum</i>	<i>rhopalopodium</i>		Ciéménçon	Tricholome à pied obèse
<i>Lyophyllum</i>	<i>transforme</i>		(Britzelmayr) Singer	
<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Moser ex Wasser, non ss Breit. et Kr.	
<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>	<i>Syn. Macrolepiota gracilentia</i>	(Fr.: Fr.) Singer	Lépiote mamelonnée
<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>		(Fr.:Fr.) Singer	
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>		(Scopoli:Fr.) Singer	Coulemelle, lépiote élevée
<i>Macrolepiota</i>	<i>rhacodes</i>		(Vittadini) Singer	
<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>	<i>Syn. Marasmius ramealis</i>	(Bulliard:Fr.) Singer	Marasme des rameaux
<i>Marasmius</i>	<i>alliaceus</i>		(Jacquin:Fr.) Fr., non ss Sowerby	
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>		(Bolton:Fr.) Fr.	
<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>		Berkeley et Broome	
<i>Megacollybia</i>	<i>platyphyla</i>		(Pers.:Fr.) Kotlaba et Pouzar	

<i>Melanoleuca</i>	<i>leucophylloides</i>		(Bon) Bon	
<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>		(Pers.:Fr.) Karsten	
<i>Merulius</i>	<i>tremellosus</i>		Schrader:Fr.	Mérule tremblante
<i>Mycena</i>	<i>alcalina</i>		(Fr.:Fr.) Kummer, ss Bresadola, non ss Kühner	
<i>Mycena</i>	<i>aurantiomarginata</i>		(Fr.:Fr.) Quélet, ss A.H.Smith, Ricken	
<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>		(Scopoli:Fr.) Gray	Mycène des fougères
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>		(Scopoli:Fr.) Gray	Mycène en forme de casque
<i>Mycena</i>	<i>maculata</i>		Karsten	Mycène tachée
<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>		(Fr.:Fr.) Quélet	
<i>Mycena</i>	<i>polygramma</i>		(Bulliard:Fr.) Gray	Mycène à pied strié
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	Mycène pure
<i>Mycena</i>	<i>romagnesiana</i>		Maas Geesteranus	
<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>		(Bulliard) Gramberg	Mycène rose
<i>Mycena</i>	<i>rosella</i>		(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Höhnel	
<i>Myriostoma</i>	<i>coliforme</i>		(Withering:Pers.) Corda	Myriostome criblé
<i>Oligoporus</i>	<i>caesius</i>	<i>Syn. Postia caesia</i>	(Schr.) Gilb. & Ryvarde	
<i>Oligoporus</i>	<i>floriformis</i>	<i>Syn. Polyporus floriformis</i>		
<i>Omphalotus</i>	<i>illudens</i>		(Schweiniz:Fr.) Bresinsky et Besl	
<i>Omphalotus</i>	<i>olearius</i>		(DC.:Fr.) Fayot	Clitocybe de l'olivier
<i>Otidea</i>	<i>bufonia</i>		(Pers. : Fr.) Boud.	Otidée peau de crapaud
<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>		(Pers.:Fr.) Fuckel	Oreille-de-lièvre
<i>Otidea</i>	<i>umbrina</i>		(Pers.:Fr.) Bresadola	
<i>Oudemansiella</i>	<i>mucida</i>		(Schrader:Fr.) Höhnel	Collybie visqueuse
<i>Panaeolus</i>	<i>retirugis</i>		(Fr.) Gillet	
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>		(Batsch:Fr.) Fr.	Paxille enroulé
<i>Perenniporia</i>	<i>fraxinea</i>		(Bulliard:Fr.) Ryvarde	
<i>Perenniporia</i>	<i>ochroleuca</i>		(Berkeley) Ryvarde	
<i>Phaeocollybia</i>	<i>lugubris</i>		(Fr.:Fr.) Heim	Phaeocollybie lugubre
<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>		(Fr.:Fr.) Patouillard	Polypore des teinturiers
<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>		L.:Pers.	Phalle impudique, satyre puant
<i>Phellinus</i>	<i>erectus</i>		David, Dequatre et Fiasson	
<i>Phellinus</i>	<i>ribis</i>		(Schumacher:Fr.) Quélet	
<i>Phellinus</i>	<i>torulosus</i>		(Pers.) Bourdot et Galzin	Polypore rouillé
<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>		(Fr.:Fr.) Karsten	Hydne noir
<i>Pholiota</i>	<i>apicrea</i>		(Fr.) Moser,	
<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>		(Batsch:Fr.) Kummer	Pholiote incandescente
<i>Pholiota</i>	<i>highlandensis</i>		(Peck) A.H.Smith et Hesler ex Quadraccia	
<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>		(Pers.:Fr.) Singer	Pholiote glutineuse
<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>		(Weigel:Fr.) Kummer	
<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>		(Bulliard:Fr.) Karsten	
<i>Pisolithus</i>	<i>arrhizus</i>		(Scopoli:Pers.) Rauschert	
<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>		(Jac.Schäffer) Kummer	Plutée couleur de cerf
<i>Pluteus</i>	<i>petasatus</i>		(Fr.) Gillet	
<i>Porodaedalea</i>	<i>pini</i>	<i>Syn. Phellinus pini</i>	(Brotero) Murrill	Polypore du pin
<i>Postia</i>	<i>ptychogaster</i>	<i>Syn. Oligoporus ptychogaster</i>	(Ludwig) Vesterholt	Polypore en coussinet
<i>Postia</i>	<i>stiptica</i>		(Pers.:Fr.) Jülich	Polypore amer
<i>Postia</i>	<i>tephroleuca</i>		(Fr.:Fr.) Jülich	
<i>Psathyrella</i>	<i>bipellis</i>		(Quélet) A.H.Smith	
<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>		(Bulliard:Fr.) Orton,	Psathyrelle hydrophile
<i>Psathyrella</i>	<i>sp.</i>			
<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>		(Bulliard:Fr.) Singer	Clitocybe en coupe
<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>		(Scopoli:Fr.) Karsten	
<i>Pycnoporellus</i>	<i>fulgens</i>		(Fr.) Donk	
<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>		(Jacquin:Fr.) Karsten	
<i>Ramaria</i>	<i>abietina</i>	<i>Syn. Ramaria ochraceovirens</i>	(Jung.) Donk	
<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>		(Pers.:Fr.) Ricken	
<i>Ramaria</i>	<i>flava</i>		(Jac. Schäffer:Fr.) Quélet	
<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>		(Pers.:Fr.) Quélet	
<i>Rhizopogon</i>	<i>luteolus</i>	<i>Syn. Rhizopogon obtextus</i>	Fr & Nordholm	
<i>Rhizopogon</i>	<i>roseolus</i>	<i>Syn. Rhizopogon rubescens</i>	(Corda) Th.M. Fries	
<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	<i>Syn. Collybia butyracea</i>	(Bulliard:Fr.) Kummer	Collybie beurrée
<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea f. asema</i>		(Fr.:Fr.) Singer	
<i>Russula</i>	<i>amara</i>		Kučera	Russule mamelonnée
<i>Russula</i>	<i>anthracina</i>		Romagnesi	
<i>Russula</i>	<i>badia</i>		Quélet	Russule perfide
<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>		(Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques, russule à cerne vert
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>		(Jac. Schäffer) Fr.	Russule charbonnière

<i>Russula</i>	<i>delica</i>		Fr.	Russule faux-lactaire, russule sans lait
<i>Russula</i>	<i>faginea</i>		Romagnesi ex Romagnesi	
<i>Russula</i>	<i>favrei</i>		Moser	
<i>Russula</i>	<i>fellea</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Russule de fiel
<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Russule à lames fourchues
<i>Russula</i>	<i>insignis</i>		Quélet, ss Quélet, non ss Burlingham	
<i>Russula</i>	<i>integra</i>		(L.) Fr., ss Maire	
<i>Russula</i>	<i>juniperina</i>		Ubaldi	
<i>Russula</i>	<i>laurocerasi</i>		Melzer	
<i>Russula</i>	<i>maculata</i>		Quélet	Russule tachée
<i>Russula</i>	<i>mairiei</i>	<i>Syn. Russula fageticola</i>	Singer	Russule émétique du hêtre
<i>Russula</i>	<i>mairiei</i>		Singer	Russule émétique du hêtre
<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>		Fr.	Russule belette
<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>		(Bulliard) Fr.	Russule noirissante
<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>		Pers.	Russule ocre et blanche
<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>		(Jac.Schäffer) Fr.	Russule olivacée
<i>Russula</i>	<i>sanguinaria</i>		(Bulliard ->C.F.Schumacher) Rauschert	Russule sanguine
<i>Russula</i>	<i>sardonia</i>	<i>Syn.Russula drimeia</i>	Fr.	Russule sardoine
<i>Russula</i>	<i>torulosa</i>		Bresadola	Russule des pinèdes
<i>Russula</i>	<i>turci</i>		Bresadola	Russule cocardée
<i>Russula</i>	<i>virescens</i>		(Jac. Schäffer) Fr.	Russule verdoyante
<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>		(Jac.Schäffer) Fr., non ss Ricken	Russule écrevisse
<i>Sarcodon</i>	<i>cyrneus</i>		Maas Geesteranus	Sarcodon corse
<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatum</i>	<i>Syn. Sarcodon imbricatus</i>	(L.:Fr.) Karsten	
<i>Scenidium</i>	<i>nitidum</i>		(Durieu et Montagne) Kuntze	
<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>		Fr.:Fr.	
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>		Pers.:Pers.	
<i>Scleroderma</i>	<i>polyrhizum</i>	<i>Syn. Scleroderma geaster</i>	(J.F. Gmel.:Pers.) Pers.	
<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>		(Bulliard:Pers.) Pers.	
<i>Scutigera</i>	<i>pes-caprae</i>		(Pers.:Fr.) Bondartsev et Singer	
<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>		(Wulfen:Fr.) Fr.	Clavaire crépue
<i>Spathularia</i>	<i>flavida</i>		Pers.:Fr.	
<i>Spongipellis</i>	<i>pachyodon</i>		(Pers.) Kotlaba et Pouzar	
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>		(Willdenow:Fr.) Pers.	
<i>Strobilurus</i>	<i>esculentus</i>		(Wulfen:Fr.) Singer,	
<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>		(M.A.Curtis:Fr.) Quélet, non ss Lange ni Bresadola	
<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>		Kreisel	Strophaire bleue
<i>Stropharia</i>	<i>coronilla</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	Strophaire coronille
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>		(L.:Fr.) Kuntze	Bolet des bouviers
<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>		(Fr.) Kuntze	Bolet à base rose
<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>		(L.:Fr.) Roussel	Vachette
<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>		(Klotzsch:Fr.) Singer	
<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>		(L.:Fr.) Roussel	Nonnette voilée
<i>Suillus</i>	<i>mediterraneensis</i>		(Jacquetant et Blum) Redeuilh	Bolet méditerranéen
<i>Suillus</i>	<i>variiegatus</i>		(Swartz:Fr.) Richon et Roze	Bolet moucheté
<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>	<i>Paxillus atrotomentosus</i>	(Batsch:Fr.) Šutara	
<i>Tapinella</i>	<i>panuoides</i>	<i>Syn. Paxillus panuoides</i>	(Fr.:Fr.) Gilbert	Paxille faux Panus
<i>Tephrocybe</i>	<i>boudieri</i>		(Kühner et Romagnesi) Derbsch	
<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>		(Wulfen:Fr.) Pilát	Tramète hirsute
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>		(L.:Fr.) Lloyd	Tramète versicolore
<i>Tremella</i>	<i>aurantia</i>		Schweiniz:Fr.	
<i>Tremella</i>	<i>mesenterica</i>		Retzius:Fr.	
<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>		(Schrank:Fr.) Ryvarden	
<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	Tricholome acerbe
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Tricholome blanc
<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>		(Chevallier) Saccardo	Tricholome à squames noires
<i>Tricholoma</i>	<i>batschii</i>	<i>Syn. Tricholoma fracticum</i>	(Britzelmayer) Kreisel	Tricholome de Batsch
<i>Tricholoma</i>	<i>bresadolanium</i>		Cléménçon	Tricholome de Bresadola
<i>Tricholoma</i>	<i>caligatum</i>		(Viviani) Ricken	Tricholome chauffé
<i>Tricholoma</i>	<i>cedretorum</i>		(Bon) Riva	Tricholome des cèdres
<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Tricholome colombette
<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>		(L.:Fr.) Kummer, ss auct.pp.	
<i>Tricholoma</i>	<i>inamoenum</i>		(Fr.:Fr.) Gillet	
<i>Tricholoma</i>	<i>pessundatum</i>		(Fr.:Fr.) Quélet	Tricholome farineux des pins
<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>		(Fr.:Fr.) Quélet	Tricholome prétentieux
<i>Tricholoma</i>	<i>pseudonictitans</i>		Bon	
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum var. squamosum</i>		(Cooke) Rea	

<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>		(Fr.) Quélet	Tricholome jaunissant
<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>		(Pers.) C.Martin	Tricholome gris perfide
<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>		(Sowerby:Fr.) Quélet	Tricholome disjoint
<i>Tricholoma</i>	<i>stiparophyllum</i>	<i>Syn. Tricholoma pseudoalbum</i>		
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer	Tricholome soufré
<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	
<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	
<i>Tricholoma</i>	<i>ustaloides</i>		Romagnesi	
<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	
<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>		(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Ricken	
<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>		(Fr.:Fr.) Singer	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Singer	Tricholome rutilant
<i>Volvariella</i>	<i>gloiocephala</i>	<i>Syn. Volvariella speciosa</i>	(DC.:Fr.)Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse
<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	<i>Syn. Boletus badius</i>	(Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert	Bolet bai
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>		(Bulliard) Quélet	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>		(Schäffer) Bon	Bolet ferrugineux
<i>Xerocomus</i>	<i>parasiticus</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	
<i>Xerocomus</i>	<i>pruinatus</i>		(Fr.) Quélet	
<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>		(L.:Fr.) Quélet	
<i>Xerula</i>	<i>radicata</i>	<i>Syn. Oudemansiella radicata</i>	(Relhan:Fr.) Dorfelt	Collybie radicante
<i>Xerula</i>	<i>pudens</i>	<i>Syn. Oudemansiella pudens</i>	(Pers.:Fr.) Singer	
<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>		(L.:Fr.) Greville	Xylaire du bois

Les noms de genre, d'espèces et les références bibliographiques sont ceux qui sont utilisés :
dans le fichier de la Société Mycologique de France (version 2012)
et dans "Le guide des champignons, France et Europe" de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux, Ed. Belin (2011).
Les noms utilisés couramment jusque là sont indiqués comme synonymes