

Salon de Montpellier, 12 & 13 octobre 2013 - Liste des espèces identifiées (224)

<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>		(Bulliard:Fr.) Singer	
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>		Jac.Schäffer, ss Lange, non ss Cooke ni ss Ricken	
<i>Agaricus</i>	<i>haemorrhoidarius</i>		Schulzer, ss Möller, non ss Lange	
<i>Agaricus</i>	<i>silvicola</i>		(Vittadini) Peck	
<i>Agrocybe</i>	<i>cylindracea</i>	<i>Syn. Agrocybe aegerita</i>	(DC.: Fr) Maire	Pholiote du peulier
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>		(Jac.Schäffer) Pers.	Amanite citrine
<i>Amanita</i>	<i>junquillea</i>	<i>Syn. Amanita gemmata</i>	Quélet	Amanite jonquille
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		(L.:Fr.) Lamarck	Amanite tue-mouches
<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>		(Bulliard:Fr.) Link	Amanite ovoïde
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>		(DC.:Fr.) Kromholz	
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>		(Fr.:Fr.) Link	Amanite phalloïde
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>		Pers.:Fr.	Amanite rougissante
<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>		(Bon) Gröger	Amanite à voive grise
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>		(Bulliard:Fr.) Lamarck	Amanite vaginée
<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>		(Vahl:Fr.) Kummer	Armillaire couleur de miel
<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>		(Romagnesi) Herink	Armillaire d'Ostoya
<i>Astraeus</i>	<i>hygrometricus</i>		(Pers.:Pers.) Morgan	Astrée hygrométrique
<i>Boletinus</i>	<i>cavipes</i>		(Klotzsch ex Fr.) Kalchbrenner	Bolet à pied creux
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>		Bulliard:Fr.	Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>		Pers.:Fr.	Bolet à pied rouge
<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>		Jac.Schäffer:Fr.	
<i>Boletus</i>	<i>queletii</i>		Schulzer	
<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>		(Kromholz) Kallenbach	
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>		Fr.:Fr.	
<i>Cerocorticium</i>	<i>molare</i>		(Chaillet ex Fr.:Fr.) Jülich et Stalpers	
<i>Chalciporus</i>	<i>pipertus</i>		(Bulliard:Fr.) Bataille	Bolet poivré
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Miller	Gomphide rutilant
<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	<i>Syn. Clavulina cristata</i>	(L.:Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe</i>	<i>decembris</i>		Singer	
<i>Clitocybe</i>	<i>ditopa</i>		(Fr.:Fr.) Gillet	
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	
<i>Clitocybe</i>	<i>inornata</i>		(Sowerby:Fr.) Gillet	
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>		(Batsch:Fr.) Kummer	Clitocybe nébuleux
<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer	Clitocybe anisé
<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe des feuilles
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>		(Scopoli:Fr.) Kummer	
<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>		R. Henry ex P.D. Orton	
<i>Cortinarius</i>	<i>anomalous</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>argutus var. fraudulosus</i>		(Britzelmayr) Melot	
<i>Cortinarius</i>	<i>azureovelatus</i>		Orton	
<i>Cortinarius</i>	<i>bivelus</i>		(Fr.:Fr.) Fr., ss Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>calochrous</i>		(Pers.:Fr.) Gray, ss Lange, non ss Cooke	
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>		(L.:Fr.) Gray	
<i>Cortinarius</i>	<i>fulvoochrascens</i>		Henry inval., non ss Moser 1960	
<i>Cortinarius</i>	<i>malicorius</i>		Fr., ss Fr., non ss Quélet	
<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>		(Fr.->) Fr., non ss Ricken ni Brandud	
<i>Cortinarius</i>	<i>renidens</i>		Fr., ss Fr., non ss Cooke	
<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>		(Fr.:Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin
<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	<i>triformis</i>		Fr., ss Ricken, Lange	
<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>		(L.:Fr.) Fr., non ss Jac.Schäffer	
<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	
<i>Cudonia</i>	<i>circinans</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	
<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>		(Scopoli) Fayod	Cystoderme furfuracé
<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>		(L.:Fr.) Pers.	
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>		(Bolton:Fr.) Schröter	Tramete rougissante
<i>Daedaleopsis</i>	<i>tricolor</i>		(Bulliard:Fr.) Bondartsev & Singer	
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>		(Swartz:Fr.) Kickx	Polypore marginé
<i>Ganoderma</i>	<i>applanatum</i>	<i>Syn. Ganoderma lipsiense</i>	(Schaeff.) With.	Ganoderme plat
<i>Ganoderma</i>	<i>carosum</i>		Patouillard	
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>		(W.Curtis:Fr.) Karsten	Ganoderme luisant
<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>		Junghuhn	
<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	<i>Syn. Gloeophyllum saepiarium</i>	(Wulfen:Fr.) Karsten	Lenzite des clôtures
<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Fr.	

<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>		(Fr.:Fr.) Murrill	Gymnopile pénétrant
<i>Gymnopilus</i>	<i>picreus</i>		(Pers.:Fr.) Karsten	
<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>	<i>Syn. Collybia fusipes</i>	(Bulliard:Fr.) Gray	Collybie à pied en fuseau
<i>Gymnopus</i>	<i>peronatus</i>	<i>Syn. Collybia peronata, Marasmius peronatus</i>	(Bolton:Fr.) Antonin, Halling & Noordel	Collybie guêtrée
<i>Gyrophorus</i>	<i>castaneus</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	Bolet châtain
<i>Hebeloma</i>	<i>laterinum</i>	<i>Syn. Hebeloma edurum</i>	(Batsch) Vesterh	Hébélome Bele-Hélène, Tante à Nanon
<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>		(Bulliard:Fr.) Ricken	Hébélome radicaant
<i>Heterobasidion</i>	<i>annosum</i>		(Fr.:Fr.) Brefeld	
<i>Hydnellum</i>	<i>aurantiacum</i>		(Batsch:Fr.) Karsten	
<i>Hydnellum</i>	<i>ferrugineum</i>		(Fr.:Fr.) Karsten	Hysnelle à pied spongieux
<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>		L.:Fr., non ss Bolton	
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>		(Wulfen:Fr.) Maire	Fausse girofle
<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>		(Fr.) Fr.	Hygrophore à odeur agréable
<i>Hygrophorus</i>	<i>chrysodon</i>		(Batsch:Fr.) Fr.	Hygrophore à dents jaunes
<i>Hygrophorus</i>	<i>discoxanthus</i>		(Fr.) Rea	Hygrophore à disque jaune
<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>		(Bulliard:Fr.) Fr.	Hygrophore blanc ivoire
<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Hypholome à lames grises
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>		(Hudson:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes
<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	<i>Syn. Hypholoma sublateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	Hypholome couleur de brique
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	
<i>Inonotus</i>	<i>hispidus</i>		(Bulliard:Fr.) Karsten	
<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	<i>Syn. Lasiochaena benzoina</i>	(Wahlenberg:Fr.) M. Bon	Polypore balsamique
<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>		(Fr.:Fr.) Singer et A.H.Smith	
<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>		Cooke	Laccaire améthyste
<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>		(Maire) Orton	
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>		(Scopoli:Fr.) Cooke	Laccaire laqué
<i>Lactarius</i>	<i>albocarneus</i>		Britzelmayr	Lactaire glutineux
<i>Lactarius</i>	<i>aurantiofulvus</i>		Blum ex Bon	Lactaire fauve orange
<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>		(Bulliard:Fr.) Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>		Fr.	Lactaire à lait jaunissant
<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>		(L.:Fr.) Gray, non ss Lange	Lactaire délicieux
<i>Lactarius</i>	<i>determinus</i>		Gröger	
<i>Lactarius</i>	<i>fluens</i>		Boudier	
<i>Lactarius</i>	<i>fuliginosus</i>		(Fr.:Fr.) Fr., ss Quélet, Kühner et Romagnesi	
<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>		(Fr.:Fr.) Fr., ss Lange, non ss Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>		Pers.:Fr., non ss Saccardo	
<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>		Fr.	
<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire tranquille
<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>		(Scopoli:Fr.) Fr.	Lactaire roux
<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>		(Paulet) Fr.	Lactaire sanguin
<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire velouté
<i>Laetiporus</i>	<i>sulphureus</i>		(Bulliard:Fr.) Murrill	
<i>Laricifomes</i>	<i>officinalis</i>		(Villars:Fr.) Kotlaba et Pouzar	
<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>		(Bulliard) Gray	
<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>		(Bulliard:Fr.) Gray	
<i>Lenzites</i>	<i>warmieri</i>		Durieu et Montagne	
<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>		(Bolton:Fr.) Kummer	Lépiote crépue
<i>Lepiota</i>	<i>ventriosospora</i>		Reid	
<i>Lepista</i>	<i>glaucocana</i>		(Bresadola) Singer	
<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>		(Scopoli) Patouillard	Clitocybe inversé
<i>Lepista</i>	<i>panaeola</i>		(Fr.) Karsten, non ss Karsten	
<i>Leucocortinarius</i>	<i>bulbiger</i>		(Albertini et Schweiniz:Fr.) Singer	
<i>Leucopaxillus</i>	<i>giganteus</i>		(Leysser:Fr.) Singer	
<i>Lycoperdon</i>	<i>echinatum</i>		Pers.:Pers.	
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>		Pers.:Pers.	Vesse de loup
<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>		(Fr.:Fr.) Singer	Tricholome en touffes
<i>Lyophyllum</i>	<i>transforme</i>		(Britzelmayr) Singer	
<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>		(Fr.:Fr.) Singer	
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>		(Scopoli:Fr.) Singer	Coulemelle, lépiote élevée
<i>Macrolepiota</i>	<i>rhacodes</i>		(Vittadini) Singer	
<i>Marasmius</i>	<i>alliaceus</i>		(Jacquin:Fr.) Fr., non ss Sowerby	
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>		(Bolton:Fr.) Fr.	
<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>		Berkeley et Broome	
<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>		(Pers.:Fr.) Kotlaba et Pouzar	
<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>		(Pers.:Fr.) Karsten	

<i>Mycena</i>	<i>alcalina</i>		(Fr.:Fr.) Kummer, ss Bresadola, non ss Kühner	
<i>Mycena</i>	<i>aurantiomarginata</i>		(Fr.:Fr.) Quélet, ss A.H.Smith, Ricken	
<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>		(Scopoli:Fr.) Gray	Mycène des fougères
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>		(Scopoli:Fr.) Gray	Mycène en forme de casque
<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>		(Fr.:Fr.) Quélet	
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	Mycène pure
<i>Mycena</i>	<i>rosella</i>		(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Höhnel	
<i>Myriostoma</i>	<i>coliforme</i>		(Withering:Pers.) Corda	Myriostome criblé
<i>Omphalotus</i>	<i>illudens</i>		(Schweiniz:Fr.) Bresinsky et Besl	
<i>Oudemansiella</i>	<i>mucida</i>		(Schrader:Fr.) Höhnel	Collybie visqueuse
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>		(Batsch:Fr.) Fr.	Paxille enroulé
<i>Perenniporia</i>	<i>fraxinea</i>		(Bulliard:Fr.) Ryvarden	
<i>Perenniporia</i>	<i>ochroleuca</i>		(Berkeley) Ryvarden	
<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>		L.:Pers.	Phalle impudique, satyre puant
<i>Phellinus</i>	<i>torulosus</i>		(Pers.) Bourdot et Galzin	Polypore rouillé
<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>		(Batsch:Fr.) Kummer	Pholiote incandescente
<i>Pholiota</i>	<i>highlandensis</i>		(Peck) A.H.Smith et Hesler ex Quadraccia	
<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>		(Pers.:Fr.) Singer	Pholiote glutineuse
<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>		(Weigel:Fr.) Kummer	
<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>		(Jac.Schäffer) Kummer	Pluté couleur de cerf
<i>Pluteus</i>	<i>petasatus</i>		(Fr.) Gillet	
<i>Porodaedalea</i>	<i>pini</i>	<i>Syn. Phellinus pini</i>	(Brotero) Murrill	Polypore du pin
<i>Postia</i>	<i>caesia</i>		(Schrader:Fr.) Karsten	
<i>Postia</i>	<i>ptychogaster</i>	<i>Syn. Oligoporus ptychogaster</i>	(Ludwig) Vesterholt	Polypore en coussinet
<i>Postia</i>	<i>stiptica</i>		(Pers.:Fr.) Jülich	Polypore amer
<i>Postia</i>	<i>tephroleuca</i>		(Fr.:Fr.) Jülich	
<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>		(Bulliard:Fr.) Orton,	Psathyrelle hydrophile
<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>		(Scopoli:Fr.) Karsten	
<i>Pycnoporellus</i>	<i>fulgens</i>		(Fr.) Donk	
<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>		(Jacquin:Fr.) Karsten	
<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>		(Pers.:Fr.) Ricken	
<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>		(Pers.:Fr.) Quélet	
<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	<i>Syn. Collybia butyracea</i>	(Bulliard:Fr.) Kummer	Collybie beurrée
<i>Russula</i>	<i>amara</i>		Kučera	Russule mamelonnée
<i>Russula</i>	<i>badia</i>		Quélet	Russule perfide
<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>		(Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques, russule à cerne vert
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>		(Jac. Schäffer) Fr.	Russule charbonnière
<i>Russula</i>	<i>delica</i>		Fr.	Russule faux-lactaire, russule sans lait
<i>Russula</i>	<i>faginea</i>		Romagnesi ex Romagnesi	
<i>Russula</i>	<i>favrei</i>		Moser	
<i>Russula</i>	<i>fellea</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Russule de fiel
<i>Russula</i>	<i>insignis</i>		Quélet, ss Quélet, non ss Burlingham	
<i>Russula</i>	<i>integra</i>		(L.) Fr., ss Maire	
<i>Russula</i>	<i>mairi</i>		Singer	émétique du hêtre
<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>		Fr.	Russule belette
<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>		(Bulliard) Fr.	Russule noirissante
<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>		Pers.	Russule ocre et blanche
<i>Russula</i>	<i>sanguinaria</i>		(Bulliard ->C.F.Schumacher) Rauschert	Russule sanguine
<i>Russula</i>	<i>sardonis</i>	<i>Syn. Russula drimeia</i>	Fr.	Russule sardoine
<i>Russula</i>	<i>turci</i>		Bresadola	Russule cocardée
<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>		(Jac.Schäffer) Fr., non ss Ricken	Russule écrevisse
<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>		Fr.:Fr.	
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>		Pers.:Pers.	
<i>Scutigera</i>	<i>pes-caprae</i>		(Pers.:Fr.) Bondartsev et Singer	
<i>Spathularia</i>	<i>flavida</i>		Pers.:Fr.	
<i>Spongipellis</i>	<i>pachyodon</i>		(Pers.) Kotlaba et Pouzar	
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>		(Willdenow:Fr.) Pers.	
<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>		(M.A.Curtis:Fr.) Quélet, non ss Lange ni Bresadola	
<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>		Kreisel	Strophaire bleue
<i>Stropharia</i>	<i>coronilla</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	Strophaire coronille
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>		(L.:Fr.) Kuntze	Bolet des bouviers
<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>		(L.:Fr.) Roussel	Vachette
<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>		(Klotzsch:Fr.) Singer	
<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>		(L.:Fr.) Roussel	Nonnette voilée
<i>Suillus</i>	<i>variegatus</i>		(Swartz:Fr.) Richon et Roze	Bolet moucheté
<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>	<i>Paxillus atrotomentosus</i>	(Batsch:Fr.) Šutara	

<i>Tapinella</i>	<i>panuoides</i>	<i>Syn. Paxillus panuoides</i>	(Fr.:Fr.) Gilbert	Paxille faux Panus
<i>Tephroclype</i>	<i>boudieri</i>		(Kühner et Romagnesi) Derbsch	
<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>		(Wulfen:Fr.) Pilát	Tramète hirsute
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>		(L.:Fr.) Lloyd	Tramète versicolore
<i>Tremella</i>	<i>mesenterica</i>		Retzius:Fr.	
<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>		(Schrank:Fr.) Ryvarden	
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Tricholome blanc
<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>		(Chevallier) Saccardo	Tricholome à squames noires
<i>Tricholoma</i>	<i>colombetta</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Tricholome colombette
<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>		(L.:Fr.) Kummer, ss auct.pp.	
<i>Tricholoma</i>	<i>pseudonictitans</i>		Bon	
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum var. squamosum</i>		(Cooke) Rea	
<i>Tricholoma</i>	<i>sculpturatum</i>		(Fr.) Quélet	Tricholome jaunissant
<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	
<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	
<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>		(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Ricken	
<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>		(Fr.:Fr.) Singer	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Singer	Tricholome rutilant
<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	<i>Syn. Boletus badius</i>	(Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert	Bolet bai
<i>Xerocomus</i>	<i>chryserteron</i>		(Bulliard) Quélet	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus</i>	<i>parasiticus</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	
<i>Xerocomus</i>	<i>pruinatus</i>		(Fr.) Quélet	
<i>Xerula</i>	<i>radicata</i>	<i>Syn. Oudemansiella radicata</i>	(Relhan:Fr.) Dorfelt	Collybie radicante
<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>		(L.:Fr.) Greville	Xylaire du bois
	Espèce	Synonyme	Auteurs	Nom vernaculaire

Les noms de genre, d'espèces et les références bibliographiques sont ceux qui sont utilisés :
dans le fichier de la Société Mycologique de France (version 2012)
et dans "Le guide des champignons, France et Europe" de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux, Ed. Belin (2011).
Les noms utilisés couramment jusque là sont indiqués comme synonymes