

Salon de Montpellier, 25 & 26 octobre 2014 - liste des espèces identifiées (194)

Genre	Espèce	Synonyme	Auteurs	Nom vernaculaire
<i>Agaricus</i>	bresadolanus	<i>Syn. Agaricus romagnesii</i>	Bohus	Agaric de Bresadola
<i>Agaricus</i>	silvicola		(Vittadini) Peck	
<i>Agaricus</i>	variegans		Møller	
<i>Agaricus</i>	xanthodermus	<i>Syn. Agaricus xanthoderma</i>	Genevier	Psallote jaunissante
<i>Agroclybe</i>	cylindracea	<i>Syn. Agroclybe aegerita</i>	(DC.:Fr) Maire	Pholiote du peulier
<i>Amanita</i>	citrina		(Jac.Schäffer) Pers.	Amanite citrine
<i>Amanita</i>	muscaria		(L.:Fr.) Lamarck	Amanite tue-mouches
<i>Amanita</i>	ovoidea		(Bulliard:Fr.) Link	Amanite ovoïde
<i>Amanita</i>	pantherina		(DC.:Fr.) Krombholz	
<i>Amanita</i>	phalloides		(Fr.:Fr.) Link	Amanite phalloïde
<i>Amanita</i>	proxima		Dumée	
<i>Amanita</i>	rubescens		Pers.:Fr.	Amanite rougissante
<i>Amanita</i>	vaginata		(Bulliard:Fr.) Lamarck	Amanite vaginée
<i>Armillaria</i>	mellea		(Vahl:Fr.) Kummer	Armillaire couleur de miel
<i>Armillaria</i>	ostoyae		(Romagnesi) Herink	Armillaire d'Ostoya
<i>Armillaria</i>	socialis	<i>Syn. Armillaria tabescens</i>	(DC./Fr.)Fayod	
<i>Auricularia</i>	auricula-judae		(Bulliard:Fr.) Wettstein	
<i>Boletus</i>	calopus		Pers.:Fr.	
<i>Boletus</i>	edulis		Bulliard:Fr.	Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus</i>	erythropus		Pers.:Fr.	Bolet à pied rouge
<i>Boletus</i>	impolitus		Fr.	
<i>Boletus</i>	lupinus		Fr., ss Romagnesi, non ss Bresadola	
<i>Boletus</i>	luridus		Jac.Schäffer:Fr.	
<i>Boletus</i>	rhodoxanthus		(Krombholz) Kallenbach	
<i>Calocera</i>	viscosa		(Pers.:Fr.) Fr.	Calocère visqueuse
<i>Calvatia</i>	excipuliformis		(Scopoli:Pers.) Perdeck	
<i>Cantharellus</i>	cibarius		Fr.:Fr.	
<i>Chalciporus</i>	piperatus		(Bulliard:Fr.) Bataille	Bolet poivré
<i>Chlorophyllum</i>	rhacodes var. bohemia	<i>Syn. Macrolepiota rhacodes</i>	(Vittad.)Vellinga	Lépiote déguenillée
<i>Ciathrus</i>	ruber		Micheli : Pers	Clathre rouge, cœur desorcière
<i>Clitocybe</i>	nebularis		(Batsch:Fr.) Kummer	Clitocybe nébuleux
<i>Clitopilus</i>	prunulus		(Scopoli:Fr.) Kummer	
<i>Cortinarius</i>	aleuriomus		R.Maire, ss Henry, Moser, non ss Lange	
<i>Cortinarius</i>	anomalous		(Fr.:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	camphoratus		(Fr.) Fr.	Cortinaire camphré
<i>Cortinarius</i>	cinnamomeus		(L.:Fr.) Gray	Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius</i>	cotoneus		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	diosmus		Kühner	
<i>Cortinarius</i>	hillieri		Henry	
<i>Cortinarius</i>	hinnuleus		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	infractus		(Pers.:Fr.) Fr.	Cortinaire à marge brisée
<i>Cortinarius</i>	lebretonii		Quélet	
<i>Cortinarius</i>	nemorensis	<i>Syn. Cortinarius varicolor var. nemorensis</i>	Fr.	
<i>Cortinarius</i>	ochroleucus		(Jac. Schäffer:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	percomis		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	prasinus		(Jac. Schäffer:Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius</i>	rapaceus		Fr.	
<i>Cortinarius</i>	rickenii		Henry ex Bidaud, Moëne-Loccoz et Reumaux	
<i>Cortinarius</i>	semisanguineus		(Fr.:Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin
<i>Cortinarius</i>	sordescens		R. Henry	
<i>Cortinarius</i>	turgidus		Fr.	
<i>Craterellus</i>	cornucopioides		(L.:Fr.) Pers.	Trompette-des-morts
<i>Craterellus</i>	lutescens		(Pers.:Fr.) Fr.	
<i>Craterellus</i>	tubaefomis	<i>Syn. Cantharellus tubiformis</i>	(Fr.:Fr.) Quélet	Chanterelle en tube
<i>Crucibulum</i>	laeve		(Hudson) Kambly	
<i>Cystoderma</i>	amianthinum		(Scopoli) Fayod	Cystoderme furfuracé
<i>Cystoderma</i>	carcharias		(Pers. : Fr) Fayod	Cystoderme dents-de-requin
<i>Daedalea</i>	quercina		(L.:Fr.) Pers.	
<i>Fomes</i>	fomentarius		(L.:Fr.) Fr.	Amadouvier
<i>Fomitopsis</i>	pinicola		(Swartz:Fr.) Kickx	Polypore marginé
<i>Funalia</i>	gallica		(Fr.) Bondartsev & Singer	
<i>Ganoderma</i>	applanatum	<i>Syn. Ganoderma lipsiense</i>	(Schaeff.) With.	Ganoderme plat
<i>Ganoderma</i>	carnosum		Patouillard	
<i>Ganoderma</i>	lucidum		(W.Curtis:Fr.) Karsten	Ganoderme luisant
<i>Ganoderma</i>	resinaceum		Boudier	
<i>Geastrum</i>	triplex		Junghuhn	
<i>Gloeophyllum</i>	sepiarium	<i>Syn. Gloeophyllum saepiarium</i>	(Wulfen:Fr.) Karsten	Lenzite des clôtures
<i>Gymnopilus</i>	penetrans		(Fr.:Fr) Murrill	Gymnopile pénétrant
<i>Gymnopus</i>	fusipes	<i>Syn. Collibia fusipes</i>	(Bull.:Fr) Gray	
<i>Gyroporus</i>	castaneus		(Bulliard:Fr.) Quélet	Bolet châtain

<i>Hebeloma</i>	crustuliniforme		(Bulliard) Quélet	
<i>Hebeloma</i>	laterinum	<i>Syn. Hebeloma edurum</i>	(Batsch) Vesterh	Hébélome Bele-Hélène, Tante à Nanon
<i>Hebeloma</i>	sinapizans		(Paulet) Sacc.	Hébélome échaudé
<i>Helvella</i>	crispa		(Scopoli:Fr.) Fr.	Helvelle crêpe
<i>Heterobasidium</i>	annosum		(Fr.:Fr.) Brefeld	
<i>Hohenbuehelia</i>	geogenia		(DC.) Singer	
<i>Hydnellum</i>	concrescens		(Pers.) Banker	
<i>Hydnellum</i>	ferrugineum		(Fr.:Fr.) Karsten	Hysnelle à pied spongieux
<i>Hydnum</i>	albidum		Peck	
<i>Hydnum</i>	repandum		L.:Fr., non ss Bolton	
<i>Hygrocybe</i>	conica		(Jac. Schäffer:Fr.) Kummer	Hygrophore conique
<i>Hygrophorus</i>	agathosmus		(Fr.) Fr.	Hygrophore à odeur agréable
<i>Hygrophorus</i>	penarius		Fr.	
<i>Hygrophorus</i>	russula		(Pers.) Wünsche	Hygrophore russule
<i>Hypholoma</i>	capnoides		(Fr.:Fr.) Kummer	Hypholome à lames grises
<i>Hypholoma</i>	fasciculare		(Hudson:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes
<i>Hypholoma</i>	lateritium	<i>Syn. Hypholoma sublateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	Hypholome couleur de brique
<i>Inocybe</i>	cookei		Bresadola	
<i>Inocybe</i>	dulcamara		(Alb. & Schw.) Kummer	Inocybe doux amer
<i>Inocybe</i>	geophylla var. lilacina		(Peck) Gillet	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe</i>	jurana		(Patouillard) Saccardo	
<i>Inocybe</i>	pudica		Kühner	Inocybe pudique
<i>Inocybe</i>	umbrina		Bresadola	
<i>Inonotus</i>	hispidus		(Bulliard:Fr.) Karsten	
<i>Inonotus</i>	tamaricis		(Patouillard) Maire	
<i>Laccaria</i>	amethystina		Cooke	Laccaire améthyste
<i>Laccaria</i>	laccata		(Scopoli:Fr.) Cooke	Laccaire laqué
<i>Lacrymaria</i>	lacrymabunda	<i>Syn. Psathyrella lacrymabunda</i>	(Bulliard:Fr.) Pat	Psathyrelle veloutée
<i>Lactarius</i>	albocarneus		Britzelmayr	Lactaire glutineux
<i>Lactarius</i>	aurantiofulvus		Blum ex Bon	Lactaire fauve orange
<i>Lactarius</i>	chrysorrhoeus		Fr.	Lactaire à lait jaunissant
<i>Lactarius</i>	determinus		Gröger	
<i>Lactarius</i>	fluens		Boudier	
<i>Lactarius</i>	lignyotus		Fr.	
<i>Lactarius</i>	quieticolor		Romagnesi	Lactaire gris orangé
<i>Lactarius</i>	quietus		(Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire tranquille
<i>Lactarius</i>	rugatus		Kühner et Romagnesi Kühner et Romagnesi	
<i>Laetiporus</i>	sulphureus		(Bulliard:Fr.) Murrill	
<i>Lepiota</i>	alba f. ochraceodisca			(Bon)
<i>Lepiota</i>	clypeolaria		(Bulliard:Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier
<i>Lepista</i>	flaccida		(Sowerby:Fr.) Patouillard , non ss Bresadola	
<i>Lepista</i>	nuda		(Bulliard:Fr.) Cooke	Pied bleu
<i>Leucopaxillus</i>	gentianeus	<i>Syn. Leucopaxillus amarus</i>	(Quélet) Kollaba	Leucopaxille amer
<i>Limacella</i>	glioderma		(Fr.) Maire	
<i>Lycoperdon</i>	perlatum		Pers.:Pers.	Vesse de loup
<i>Lyophyllum</i>	decastes		(Fr.:Fr.) Singer	Tricholome en touffes
<i>Macrolepiota</i>	excoriata		(Jac.Schäffer:Fr.) Moser ex Wasser, non ss Breit. et Kr.	
<i>Macrolepiota</i>	procera		(Scopoli:Fr.) Singer	Coulemelle, lépiote élevée
<i>Marasmius</i>	alliaceus		(Jacquin:Fr.) Fr., non ss Sowerby	
<i>Mycena</i>	pura		(Pers.:Fr.) Kummer	Mycène pure
<i>Myriostoma</i>	coliforme		(Withering:Pers.) Corda	Myriostome criblé
<i>Oligoporus</i>	floriformis	<i>Syn. Ployporus floriformis</i>		
<i>Omphalotus</i>	olearius		(DC.:Fr.) Fayot	Clitocybe de l'olivier
<i>Otidea</i>	bufonia		(Pers. : Fr.) Boud.	Otidée peau de crapaud
<i>Otidea</i>	umbrina		(Pers.:Fr.) Bresadola	
<i>Panaeolus</i>	retirugis		(Fr.) Gillet	
<i>Paxillus</i>	involutus		(Batsch:Fr.) Fr.	Paxille enroulé
<i>Perenniporia</i>	fraxinea		(Bulliard:Fr.) Ryvarden	
<i>Phaeolus</i>	schweinitzii		(Fr.:Fr.) Patouillard	Polypore des teinturiers
<i>Phellinus</i>	erectus		David, Dequatre et Fiasson	
<i>Phellinus</i>	ribis		(Schumacher:Fr.) Quélet	
<i>Phellinus</i>	torulosus		(Pers.) Bourdot et Galzin	Polypore rouillé
<i>Pholiota</i>	apicrea		(Fr.) Moser,	
<i>Pholiota</i>	squarrosa		(Weigel:Fr.) Kummer	
<i>Piptoporus</i>	betulinus		(Bulliard:Fr.) Karsten	
<i>Pisolithus</i>	arrhizus		(Scopoli:Pers.) Rauschert	
<i>Postia</i>	ptychogaster	<i>Syn. Oligoporus ptychogaster</i>	(Ludwig) Vesterholt	Polypore en coussinet
<i>Psathyrella</i>	pilluliformis		(Bulliard:Fr.) Orton,	Psathyrelle hydrophile
<i>Pseudohydnum</i>	gelatinosum		(Scopoli:Fr.) Karsten	
<i>Pycnoporellus</i>	fulgens		(Fr.) Donk	
<i>Pycnoporus</i>	cinnabarinus		(Jacquin:Fr.) Karsten	
<i>Ramaria</i>	botrytis		(Pers.:Fr.) Ricken	
<i>Ramaria</i>	flava		(Jac. Schäffer:Fr.) Quélet	

<i>Rhizopogon</i>	roseolus	<i>Syn. Rhizopogon rubescens</i>	(Corda) Th.M. Fries	
<i>Rhodocollybia</i>	butyracea f. asema		(Fr.:Fr.) Singer	
<i>Russula</i>	anthracina		Romagnesi	
<i>Russula</i>	badia		Quélet	Russule perfide
<i>Russula</i>	chloroides		(Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques, russule à cerne vert
<i>Russula</i>	delica		Fr.	Russule faux-lactaire, russule sans lait
<i>Russula</i>	fellea		(Fr.:Fr.) Fr.	Russule de fiel
<i>Russula</i>	heterophylla		(Fr.:Fr.) Fr.	Russule à lames fourchues
<i>Russula</i>	juniperina		Ubaldi	
<i>Russula</i>	laurocerasi		Melzer	
<i>Russula</i>	maculata		Quélet	Russule tachée
<i>Russula</i>	mustelina		Fr.	Russule belette
<i>Russula</i>	ochroleuca		Pers.	Russule ocre et blanche
<i>Russula</i>	sardonis	<i>Syn. Russula drimeia</i>	Fr.	Russule sardoine
<i>Russula</i>	torulosa		Bresadola	Russule des pinèdes
<i>Russula</i>	turci		Bresadola	Russule cocardée
<i>Sarcodon</i>	cyrneus		Maas Geesteranus	Sarcodon corse
<i>Sarcodon</i>	imbricatum	<i>Syn. Sarcodon imbricatus</i>	(L.:Fr.) Karsten	
<i>Scenidium</i>	nitidum		(Durieu et Montagne) Kuntze	
<i>Schizophyllum</i>	commune		Fr.:Fr.	
<i>Scleroderma</i>	citrinum		Pers.:Pers.	
<i>Scleroderma</i>	polyrhizum	<i>Syn. Scleroderma geaster</i>	(J.F. Gmel.:Pers.) Pers.	
<i>Scleroderma</i>	verrucosum		(Bulliard:Pers.) Pers.	
<i>Strobilurus</i>	esculentus		(Wulfen:Fr.) Singer,	
<i>Stropharia</i>	aeruginosa		(M.A.Curtis:Fr.) Quélet, non ss Lange ni Bresadola	
<i>Suillus</i>	collinitus		(Fr.) Kuntze	Bolet à base rose
<i>Suillus</i>	variegatus		(Swartz:Fr.) Richon et Roze	Bolet moucheté
<i>Tapinella</i>	atrotomentosa	<i>Paxillus atrotomentosus</i>	(Batsch:Fr.) Šutara	
<i>Trametes</i>	versicolor		(L.:Fr.) Lloyd	Tramète versicolore
<i>Tremella</i>	aurantia		Schweiniz:Fr.	
<i>Tricholoma</i>	acerbum		(Bulliard:Fr.) Quélet	Tricholome acerbe
<i>Tricholoma</i>	batschii	<i>Syn. Tricholoma fracticum</i>	(Britzelmayr) Kreisel	Tricholome de Batsch
<i>Tricholoma</i>	caligatum		(Viviani) Ricken	Tricholome chaussé
<i>Tricholoma</i>	equestre		(L.:Fr.) Kummer, ss auct.pp.	
<i>Tricholoma</i>	inanoenum		(Fr.:Fr.) Gillet	
<i>Tricholoma</i>	pseudonititans		Bon	
<i>Tricholoma</i>	saponaceum		(Fr.:Fr.) Kummer	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma</i>	scalpturatum		(Fr.) Quélet	Tricholome jaunissant
<i>Tricholoma</i>	stiparophyllum	<i>Syn. Tricholoma pseudoalbum</i>		
<i>Tricholoma</i>	sulphureum		(Bulliard:Fr.) Kummer	Tricholome soufré
<i>Tricholoma</i>	ustale		(Fr.:Fr.) Kummer	
<i>Tricholoma</i>	ustaloides		Romagnesi	
<i>Tricholoma</i>	vaccinum		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	
<i>Tricholoma</i>	virgatum		(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Ricken	
<i>Volvariella</i>	gloiocephala	<i>Syn. Volvariella speciosa</i>	(DC.:Fr.)Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse
<i>Xerocomus</i>	badius	<i>Syn. Boletus badius</i>	(Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert	Bolet bai
<i>Xerocomus</i>	chryseron		(Bulliard) Quélet	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus</i>	ferrugineus		(Schäffer) Bon	Bolet ferrugineux
<i>Xerocomus</i>	pruinatus		(Fr.) Quélet	
<i>Xerocomus</i>	subtomentosus		(L.:Fr.) Quélet	
<i>Xerulla</i>	pubens	<i>Syn. Oudemantiella pudens</i>	(Pers.:Fr.) Singer	

Les noms de genre, d'espèces et les références bibliographiques sont ceux qui sont utilisés :
dans le fichier de la Société Mycologique de France (version 2012)
et dans "Le guide des champignons, France et Europe" de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux, Ed. Belin (2011).
Les noms utilisés couramment jusque là sont indiqués comme synonymes