

Salon de Montpellier, 24 & 25 octobre 2015 - liste des espèces identifiées (253)

Genre	Espèce	Synonyme	Auteurs	Nom vernaculaire
<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>		(Bulliard:Fr.) Singer	
<i>Agaricus</i>	<i>bresadolanus</i>	<i>Syn. Agaricus romagnesii</i>	Bohus	Agaric de Bresadola
<i>Agaricus</i>	<i>menieri</i>		Bon	Agaric des dunes
<i>Agaricus</i>	<i>phaeolepidotus</i>		(Møller) Møller	Agaric à écailles sombres
<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	<i>Syn. Agaricus xanthoderma</i>	Genevier	Psallote jaunissante
<i>Agrocybe</i>	<i>cylindracea</i>	<i>Syn. Agrocybe aegerita</i>	(DC.: Fr) Maire	Pholiote du peulier
<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>		(Pers.:Fr.) Fuckel	Pézize orangée
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>		(Jac.Schäffer) Pers.	Amanite citrine
<i>Amanita</i>	<i>junquillea</i>	<i>Syn. Amanita gemmata</i>	Quélet	Amanite jonquille
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		(L.:Fr.) Lamarck	Amanite tue-mouches
<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>		(Bulliard:Fr.) Link	Amanite ovoïde
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>		(Fr.:Fr.) Link	Amanite phalloïde
<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>		Albertini et Schweiniz : Fr.	Amanite porphyre
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>		Pers.:Fr.	Amanite rougissante
<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>		(Bon) Gröger	Amanite à volve grise
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>		(Bulliard:Fr.) Lamarck	Amanite vaginée
<i>Ampulloclitocybe</i>	<i>clavipes</i>	<i>Syn. Clitocybe clavipes</i>	(Pers.:Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncal.	Clitocybe à pied en massue
<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>		(Vahl:Fr.) Kummer	Armillaire couleur de miel
<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>		(Romagnesi) Herink	Armillaire d'Ostoya
<i>Armillaria</i>	<i>sp.</i>			
<i>Astraeus</i>	<i>hygrometricus</i>		(Pers.:Pers.) Morgan	Astrée hygrométrique
<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>		(Willdenow:Fr.) Karsten	Tramete brûlée
<i>Boletinus</i>	<i>cavipes</i>		(Klotzsch ex Fr.) Kalchbrenner	Bolet à pied creux
<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>		(Paulet) Fr	Cèpe d'été
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>		Bulliard:Fr.	Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>		Pers.:Fr.	Bolet à pied rouge
<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>		Pilát et Dermek	Cèpe des pins
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus</i>	<i>ferruginascens</i>		Orton	Girolle ferrugineuse
<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>		(Bulliard:Fr.) Bataille	Bolet poivré
<i>Chamaemyces</i>	<i>fracidus</i>		(Fr.) Donk	Lépiote guttulée
<i>Chlorophyllum</i>	<i>brunneum</i>	<i>Syn. Macrolepiota venenata</i>	(Farlow et Burt) Vellinga	Lépiote vénéneuse
<i>Chlorophyllum</i>	<i>rhacodes</i>	<i>Syn. Macrolepiota rhacodes</i>	(Vittad.)Vellinga	Lépiote déguenillée
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Miller	Gomphide rutilant
<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>		Micheli : Pers	Clathre rouge, cœur de sorcière
<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>		(L.:Fr.) Donk	Clavaire en massue
<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>		(Quélet) Donk	Clavaire tronquée
<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>		(Bulliard:Fr.) Schröter	Clavaire cendrée
<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	<i>Syn. Clavulina cristata</i>	(L.:Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe</i>	<i>candicans</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe blanchissant
<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>		Kühner et Romagnesi	Clitocybe cotelé
<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>		(Withering:Fr.) Kummer	Clitocybe anisé strié
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>		(Batsch:Fr.) Kummer	Clitocybe nébuleux
<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer	Clitocybe anisé
<i>Clitocybe</i>	<i>phylophila</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe des feuilles
<i>Clitocybula</i>	<i>lenta</i>		(Maire) Malençon et Bertault	
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>		(Scopoli:Fr.) Kummer	
<i>Coprinellus</i>	<i>disseminatus</i>	<i>Syn. Coprinus disseminatus</i>	(Pers.:Fr.) J.E. Lange	Coprin grégaire, coprin disséminé
<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	<i>Syn. Coprinus micaceus</i>	(Bulliard:Fr.) Vilgalys et coll.	Coprin micacé
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>		(O.F.Müller:Fr.) Pers.	Coprin chevelu
<i>Cortinarius</i>	<i>caerulescens</i>		(Jac.Schäffer) Fr.	Cortinaire bleu
<i>Cortinarius</i>	<i>caligatus</i>		Malençon	Cortinaire chaussé
<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>		(Fr.) Fr.	Cortinaire camphré
<i>Cortinarius</i>	<i>caperatus</i>	<i>Syn. Rozites caperatus</i>	(Pers.:Fr.) Karsten	Pholiote ridée
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>		(L.:Fr.) Gray	Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius</i>	<i>duracinus</i>		Fr.	Cortinaire à pied dur
<i>Cortinarius</i>	<i>gentianeus</i>	<i>Syn. Cortinarius amarescens</i>	Bidaud	
<i>Cortinarius</i>	<i>herculeus</i>		Malençon	Cortinaire herculéen
<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	Cortinaire à marge brisée
<i>Cortinarius</i>	<i>mucifluoides</i>		Henry	
<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>		(Fr.:Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin
<i>Cortinarius</i>	<i>sordescens</i>		R. Henry	
<i>Cortinarius</i>	<i>splendificus</i>		Chevassut et Henry	Cortinaire éclatant
<i>Cortinarius</i>	<i>suillus</i>		Fr.	Cortinaire des porcs

<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>		Lange	Cortinaire trivial
<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>		(L.:Fr.) Pers.	Trompette-des-morts
<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	<i>Syn. Cantharellus tubiformis</i>	(Fr.:Fr.) Quélet	Chanterelle en tube
<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>		(Scopoli) Fayod	Cystoderme furfuracé
<i>Cystoderma</i>	<i>carcharias</i>		(Pers. : Fr) Fayod	Cystoderme dents-de-requin
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>		(Bolton:Fr.) Schröter	Tramete rougissante
<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>		(Kühner et Romagnesi) Kubicka	
<i>Entoloma</i>	<i>politum</i>		(Pers.:Fr.) Donk	
<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	
<i>Flammula</i>	<i>pinicola</i>	<i>Syn. Pholiota pinicola</i>	Jacobsson	Flammule des pins
<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>		(L.:Fr.) Fr.	Amadouvier
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>		(Swartz:Fr.) Kickx	Polypore marginé
<i>Ganoderma</i>	<i>aplanatum</i>	<i>Syn. Ganoderma lipsiense</i>	(Schaeff.) With.	Ganoderme plat
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>		(W.Curtis:Fr.) Karsten	Ganoderme luisant
<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>	<i>Syn. Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar	Geastre sessile
<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	<i>Syn. Gloeophyllum saepiarium</i>	(Wulfen:Fr.) Karsten	Lenzite des clôtures
<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>		(Fr.:Fr.) Murrill	Gymnopile pénétrant
<i>Gymnopilus</i>	<i>spectabilis</i>		(Fr.) Singer	Gymnopile remarquable
<i>Gymnopus</i>	<i>brassicolens</i>	<i>Syn. Micromphale brassicolens</i>	(Romagn.) Antonin & Noordel	Marasme à odeur de chou
<i>Gymnopus</i>	<i>confluens</i>	<i>Syn. Collybia confluens</i>	(Pers.:Fr.) Antonin, Halling & Noordel	Collybie en touffes
<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>	<i>Syn. Collybia fusipes</i>	(Bulliard:Fr.) Gray	Collybie à pied en fuseau
<i>Gymnopus</i>	<i>peronatus</i>	<i>Syn. Collybia peronata, Marasmus peronatus</i>	(Bolton:Fr.) Antonin, Halling & Noordel	Collybie guêtrée
<i>Gyromitra</i>	<i>infula</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Quélet	Gyromitre en turban
<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	Bolet châtain
<i>Hebeloma</i>	<i>angustispermum</i>	<i>Syn. Hebeloma cylindrosporium</i>	A. Pearson	
<i>Hebeloma</i>	<i>laterinum</i>	<i>Syn.Hebeloma edurum</i>	(Batsch) Vesterh	Hébélome Belle-Hélène
<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>		(Bulliard:Fr.) Ricken	Hébélome radicant
<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>		(Paulet) Sacc.	Hébélome échaudé
<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>		(Scopoli:Fr.) Fr.	Helvelle crépue
<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>		Afzelius:Fr.	Helvelle en selle
<i>Helvella</i>	<i>macropus</i>		(Pers.:Fr.) Karsten	Helvelle à long pied
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>geogenia</i>		(DC.) Singer	
<i>Hydnellum</i>	<i>caeruleum</i>		(Horneman) Karsten	Hydnelle bleu
<i>Hydnellum</i>	<i>ferrugineum</i>		(Fr.:Fr.) Karsten	Hysnelle à pied spongieux
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>		Pers.:Fr.	Hydne rougissant
<i>Hygrocybe</i>	<i>chlorophana</i>		(Fr.:Fr.) Wünsche	Hygrocybe jaune soufre
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>		(Jac. Schäffer:Fr.) Kummer	Hygrophore conique
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>		(Wulfen:Fr.) Maire	Fausse girolle
<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>		(Fr.) Fr.	Hygrophore à odeur agréable
<i>Hygrophorus</i>	<i>chrysdon</i>		(Batsch:Fr.) Fr.	Hygrophore à dents jaunes
<i>Hygrophorus</i>	<i>discoxanthus</i>		(Fr.) Rea	Hygrophore à disque jaune
<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>		(Bulliard:Fr.) Fr.	Hygrophore blanc ivoire
<i>Hygrophorus</i>	<i>hypothejus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Hygrophore jaunissant
<i>Hygrophorus</i>	<i>latitabundus</i>		Britzelmayr	Hygrophore limace
<i>Hygrophorus</i>	<i>lucorum</i>		Kalchbrenner	Hygrophore des mélèzes
<i>Hygrophorus</i>	<i>nemoreus</i>		(Pers.:Fr.) Fr.	Hygrophore des bois
<i>Hygrophorus</i>	<i>pudorinus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Hygrophore pudibond
<i>Hygrophorus</i>	<i>russula</i>		(Pers.) Wünsche	Hygrophore russule
<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Hypholome à lames grises
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>		(Hudson:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes
<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	<i>Syn. Hypholoma sublateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	Hypholome couleur de brique
<i>Hypholoma</i>	<i>marginatum</i>		(Pers.:Fr.) Schröter	Hypholome disséminé
<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>		(Weinmann) Quélet	Inocybe à odeur de Benjoin
<i>Inocybe</i>	<i>corydalina</i>		Quélet	Inocybe à melon vert
<i>Inocybe</i>	<i>curvipes</i>		Karsten	Inocybe variable
<i>Inocybe</i>	<i>decipiens</i>		Bresadola	
<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>		(Alb. & Schw.) Kummer	Inocybe doux amer
<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>		(Pers. : Fr) P. Kumm	Inocybe à odeur de poire
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>		(Peck) Gillet	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe</i>	<i>godeyi</i>		Gillet	Inocybe de Godey
<i>Inocybe</i>	<i>griseoillacina</i>		Lange	Inocybe gris lilas
<i>Inocybe</i>	<i>haemacta</i>		(Berkeley et Cooke) Saccardo	Inocybe rouge et vert
<i>Inocybe</i>	<i>hirtella</i>		Bresadola	Inocybe à odeur d'amande amère
<i>Inocybe</i>	<i>posterula</i>	<i>Syn. Tricholoma xanthodisca</i>	(Britzelmayr) Saccardo	Inocybe tardif
<i>Inocybe</i>	<i>pudica</i>		Kühner	Inocybe pudique
<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	<i>Syn. Lasioclaena benzoina</i>	(Wahlenberg:Fr.) M. Bon	Polypore balsamique
<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>		Cooke	Laccaire améthyste

<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>		(Scopoli:Fr.) Cooke	Laccaire laqué
<i>Lacrymaria</i>	<i>lacrymabunda</i>	<i>Syn. Psathyrella lacrymabunda</i>	(Bulliard:Fr.) Pat	Psathyrelle veloutée
<i>Lactarius</i>	<i>albocarneus</i>		Britzelmayr	Lactaire glutineux
<i>Lactarius</i>	<i>atlanticus</i>		Bon	Lactaire des chênes verts
<i>Lactarius</i>	<i>aurantiofulvus</i>		Bon ex Bon	Lactaire fauve orange
<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrhoeus</i>		Fr.	Lactaire à lait jaunissant
<i>Lactarius</i>	<i>controversus</i>		Pers.:Fr.	Lactaire renversé
<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>		(L.:Fr.) Gray, non ss Lange	Lactaire délicieux
<i>Lactarius</i>	<i>necator</i>		(Bulliard:Fr.) Pers.	Lactaire plombé
<i>Lactarius</i>	<i>quieticolor</i>		Romagnesi	Lactaire gris orangé
<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire tranquille
<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>		(Scopoli:Fr.) Fr.	Lactaire roux
<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>		(Paulet) Fr.	Lactaire sanguin
<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>		(Pers.:Fr.) Gray	Lactaire presque doux
<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire velouté
<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>		(Bulliard) Fr.	Lactaire zoné
<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>		(Bolton:Fr.) Kummer	Lépiote crépue
<i>Lepiota</i>	<i>kuehneri</i>		Huijsman ex Hora	
<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>		(Scopoli) Patouillard	Clitocybe inversé
<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>		(Bulliard:Fr.) Cooke	Pied bleu
<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>		(Vittadini) Wasser	Lépiote pudique
<i>Leucopaxillus</i>	<i>cutefractus</i>		Noordeloos	Leucopaxille craquelé
<i>Leucopaxillus</i>	<i>gentianeus</i>	<i>Syn. Leucopaxillus amarus</i>	(Quélet) Kottaba	Leucopaxille amer
<i>Leucopaxillus</i>	<i>paradoxus</i>		(Constantin & Dufour) Bours.	Leucopaxille à odeur de poulailler
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>		Pers.:Pers.	Vesse de loup
<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>		(Fr.:Fr.) Singer	Tricholome en touffes
<i>Lyophyllum</i>	<i>fumosum</i>		(Pers.:Fr.) Kühner ex Orton	Tricholome enfumé
<i>Lyophyllum</i>	<i>rhopalopodium</i>		Cléménçon	Tricholome à pied obèse
<i>Macrolepiota</i>	<i>mastodea</i>	<i>Syn. Macrolepiota gracilentia</i>	(Fr.: Fr.) Singer	Lépiote mamelonnée
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>		(Scopoli:Fr.) Singer	Coulemelle, lépiote élevée
<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>	<i>Syn. Marasmius ramealis</i>	(Bulliard:Fr.) Singer	Marasme des rameaux
<i>Melanoleuca</i>	<i>leucophylloides</i>		(Bon) Bon	
<i>Merulius</i>	<i>tremellosus</i>		Schrader:Fr.	Mérule tremblante
<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>		(Scopoli:Fr.) Gray	Mycène des fougères
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>		(Scopoli:Fr.) Gray	Mycène en forme de casque
<i>Mycena</i>	<i>maculata</i>		Karsten	Mycène tachée
<i>Mycena</i>	<i>polygramma</i>		(Bulliard:Fr.) Gray	Mycène à pied strié
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>		(Pers.:Fr.) Kummer	Mycène pure
<i>Mycena</i>	<i>romagnesiana</i>		Maas Geesteranus	
<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>		(Bulliard) Gramberg	Mycène rose
<i>Myriostoma</i>	<i>coliforme</i>		(Withering:Pers.) Corda	Myriostome criblé
<i>Oligoporus</i>	<i>caesius</i>	<i>Syn. Postia caesia</i>	(Schrad.) Gilb. & Ryvarden	
<i>Omphalotus</i>	<i>olearius</i>		(DC.:Fr.) Fayot	Clitocybe de l'olivier
<i>Otidea</i>	<i>bufonia</i>		(Pers.: Fr.) Boud.	Otidée peau de crapaud
<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>		(Pers.:Fr.) Fuckel	Oreille-de-lièvre
<i>Oudemansiella</i>	<i>mucida</i>		(Schrader:Fr.) Höhnel	Collybie visqueuse
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>		(Batsch:Fr.) Fr.	Paxille enroulé
<i>Phaeocollybia</i>	<i>lugubris</i>		(Fr.:Fr.) Heim	Phaeocollybie lugubre
<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>		(Fr.:Fr.) Patouillard	Polypore des teinturiers
<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>		L.:Pers.	Phalle impudique, satyre puant
<i>Phellinus</i>	<i>torulosus</i>		(Pers.) Bourdot et Galzin	Polypore rouillé
<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>		(Fr.:Fr.) Karsten	Hydne noir
<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>		(Batsch:Fr.) Kummer	Pholiote incandescente
<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>		(Pers.:Fr.) Singer	Pholiote glutineuse
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>		(Jac.Schäffer) Kummer	Plutée couleur de cerf
<i>Porodaedalea</i>	<i>pini</i>	<i>Syn. Phellinus pini</i>	(Brotero) Murrill	Polypore du pin
<i>Postia</i>	<i>ptychogaster</i>	<i>Syn. Oligoporus ptychogaster</i>	(Ludwig) Vesterholt	Polypore en coussinet
<i>Postia</i>	<i>stiptica</i>		(Pers.:Fr.) Jülich	Polypore amer
<i>Psathyrella</i>	<i>bipellis</i>		(Quélet) A.H.Smith	
<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>		(Bulliard:Fr.) Orton,	Psathyrelle hydrophile
<i>Psathyrella</i>	<i>sp.</i>			
<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>		(Bulliard:Fr.) Singer	Clitocybe en coupe
<i>Ramaria</i>	<i>abietina</i>	<i>Syn. Ramaria ochraceovirens</i>	(Jungh.) Donk	
<i>Rhizopogon</i>	<i>luteolus</i>	<i>Syn. Rhizopogon obtectus</i>	Fr & Nordholm	
<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	<i>Syn. Collybia butyracea</i>	(Bulliard:Fr.) Kummer	Collybie beurrée
<i>Russula</i>	<i>amara</i>		Kučera	Russule mamelonnée

<i>Russula</i>	<i>badia</i>		Quélet	Russule perfide
<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>		(Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>		(Jac. Schäffer) Fr.	Russule charbonnière
<i>Russula</i>	<i>delica</i>		Fr.	Russule faux-lactaire
<i>Russula</i>	<i>fellea</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Russule de fiel
<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>		(Fr.:Fr.) Fr.	Russule à lames fourchues
<i>Russula</i>	<i>mairei</i>	<i>Syn. Russula fageticola</i>	Singer	Russule émétiq. du hêtre
<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>		Fr.	Russule belette
<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>		(Bulliard) Fr.	Russule noirçissante
<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>		Pers.	Russule ocre et blanche
<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>		(Jac.Schäffer) Fr.	Russule olivacée
<i>Russula</i>	<i>sardonina</i>	<i>Syn. Russula drimeia</i>	Fr.	Russule saradoine
<i>Russula</i>	<i>torulosa</i>		Bresadola	Russule des pinèdes
<i>Russula</i>	<i>turci</i>		Bresadola	Russule cocardée
<i>Russula</i>	<i>virescens</i>		(Jac. Schäffer) Fr.	Russule verdoyante
<i>Sarcodon</i>	<i>cyrneus</i>		Maas Geesteranus	Sarcodon corse
<i>Scenidium</i>	<i>nitidum</i>		(Durieu et Montagne) Kuntze	
<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>		Fr.:Fr.	
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>		Pers.:Pers.	
<i>Scleroderma</i>	<i>polyrhizum</i>	<i>Syn. Scleroderma geaster</i>	(J.F. Gmel.:Pers.) Pers.	
<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>		(Wulfen:Fr.) Fr.	Clavaire crépue
<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>		Kreisel	Strophaire bleue
<i>Stropharia</i>	<i>coronilla</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	Strophaire coronille
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>		(L.:Fr.) Kuntze	Bolet des bouviers
<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>		(Fr.) Kuntze	Bolet à base rose
<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>		(L.:Fr.) Roussel	Vachette
<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>		(L.:Fr.) Roussel	Nonnette voilée
<i>Suillus</i>	<i>mediterraneensis</i>		(Jacquetant et Blum) Redeuilh	Bolet méditerranéen
<i>Suillus</i>	<i>variegatus</i>		(Swartz:Fr.) Richon et Roze	Bolet moucheté
<i>Tapinella</i>	<i>panuoides</i>	<i>Syn. Paxillus panuoides</i>	(Fr.:Fr.) Gilbert	Paxille faux Panus
<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>		(Wulfen:Fr.) Pilát	Tramète hirsute
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>		(L.:Fr.) Lloyd	Tramète versicolore
<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>		(Bulliard:Fr.) Quélet	Tricholome acerbe
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Tricholome blanc
<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>		(Chevallier) Saccardo	Tricholome à squames noires
<i>Tricholoma</i>	<i>batschii</i>	<i>Syn. Tricholoma fracticum</i>	(Britzelmayr) Kreisel	Tricholome de Batsch
<i>Tricholoma</i>	<i>bresadolianum</i>		Cléménçon	Tricholome de Bresadola
<i>Tricholoma</i>	<i>caligatum</i>		(Viviani) Ricken	Tricholome chaussé
<i>Tricholoma</i>	<i>cedretorum</i>		(Bon) Riva	Tricholome des cèdres
<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Tricholome colombette
<i>Tricholoma</i>	<i>pessundatum</i>		(Fr.:Fr.) Quélet	Tricholome farineux des pins
<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>		(Fr.:Fr.) Quélet	Tricholome prétentieux
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>		(Fr.:Fr.) Kummer	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>		(Fr.) Quélet	Tricholome jaunissant
<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>		(Pers.) C.Martin	Tricholome gris perfide
<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>		(Sowerby:Fr.) Quélet	Tricholome disjoint
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>		(Bulliard:Fr.) Kummer	Tricholome soufré
<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>		(Fr.:Fr.) Singer	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>		(Jac.Schäffer:Fr.) Singer	Tricholome rutilant
<i>Volvariella</i>	<i>gloiocephala</i>	<i>Syn. Volvariella speciosa</i>	(DC.:Fr.)Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse
<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	<i>Syn. Boletus badius</i>	(Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert	Bolet bai
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>		(Bulliard) Quélet	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>		(Schäffer) Bon	Bolet ferrugineux
<i>Xerula</i>	<i>radicata</i>	<i>Syn. Oudemansiella radicata</i>	(Relhan:Fr.) Dorfelt	Collybie radicante
<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>		(L.:Fr.) Greville	

Les noms de genre, d'espèces et les références bibliographiques sont ceux qui sont utilisés :
dans le fichier de la Société Mycologique de France (version 2012)
et dans "Le guide des champignons, France et Europe" de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux, Ed. Belin (2011).
Les noms utilisés couramment jusque là sont indiqués comme synonymes