

Sortie du 13 septembre 2017, Pont de Rousty, Arles

| Famille | Nom scientifique reconnu (TAXREF v7) | Noms vernaculaires (TAXREF v7) | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Adoxaceae | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | Sureau yèble, Herbe à l'aveugle | |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | Amarante réfléchie, Amarante à racine rouge, Blé rouge | |
| | <i>Atriplex halimus</i> L., 1753 | Halime, Arroche halime | |
| | <i>Atriplex tatarica</i> L., 1753 | Arroche de Tartarie | |
| | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcangeli, 1882 | Bette maritime | |
| | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | Chénopode blanc, Senousse | |
| Apiaceae | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 | Soude vraie, Suéda fruticuleux | |
| | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Daucus carotte | |
| | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | Chardon Roland, Panicaut champêtre | |
| Araceae | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | Fenouil commun | |
| | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Petite lentille d'eau | |
| Aristolochiaceae | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | Spirodèle à plusieurs racines | |
| Asteraceae | <i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753 | Aristolochie clématite, Poison de terre | |
| | <i>Artemisia annua</i> L., 1753 | Armoise annuelle | |
| | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu | |
| | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des champs, Chardon des champs | |
| | <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753 | Crépide à feuilles de capselle | |
| | <i>Ditrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973 | Inule visqueuse | |
| | <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753 | Érigéron crépu | |
| | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | Conyze du Canada | |
| | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | Vergerette de Barcelone | |
| | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973 | Picride fausse Vipérine | |
| | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | Laitue scariole, Escarole | |
| | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux | |
| | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique | |
| | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791 | Chardon marie, Chardon marbré | |
| | <i>Sonchus maritimus</i> L., 1759 | Laiteron maritime | |
| | <i>Symphotrichum subulatum</i> var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundb., 2004 | Aster écailléux | |
| | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | Salsifis des prés | |
| | Boraginaceae | <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | Héliotrope d'Europe |
| | Caprifoliaceae | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage |
| | | <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> (L.) Fiori, 1903 | Scabieuse maritime |
| | Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | Liseron des haies, Vrillée |
| | | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | Liset |
| | Cornaceae | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | Cornouiller sanguin, Sanguine |
| | Cucurbitaceae | <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich., 1824 | Concombre d'âne, Momordique, Concombre sauvage |
| | Cyperaceae | <i>Bolboschoenus maritimus</i> gpe | |
| <i>Cyperus difformis</i> L., 1756 | | Souchet difforme | |
| Elaeagnaceae | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753 | Olivier de bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradis | |
| Equisetaceae | <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799 | Prêle très rameuse, Prêle rameuse | |
| Fabaceae | <i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753 | Indigo du Bush, Amorphe buissonnante | |
| | <i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>gracile</i> (Jord.) Rouy, 1899 | Dorycnium grêle | |
| | <i>Lathyrus incurvus</i> (Roth) Willd., 1802 | Gesse | |
| | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | Luzerne cultivée | |
| | <i>Melilotus</i> sp. | Mélicot | |
| | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | Robinier faux-acacia, Carouge | |
| | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | |
| | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | |
| | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | |
| | <i>Vicia cracca</i> gpe | | |
| Juncaceae | <i>Juncus acutus</i> L., 1753 | Jonc aigu, Jonc à tépales pointus | |
| Lamiaceae | <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek, 1929 | Ballote du Midi | |
| | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycopo d'Europe, Chanvre d'eau | |
| Lythraceae | <i>Ammannia coccinea</i> Rottb., 1773 | Ammannia écarlate | |
| | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre | |
| Malvaceae | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | Guimauve officinale | |
| Onagraceae | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | |
| | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Jussie | |
| | <i>Oenothera biennis</i> gpe | Onagre bisannuelle | |
| Plantaginaceae | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | Linaire commune | |
| | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | Plantain corne-de-cerf | |
| | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | |
| | <i>Plantago major</i> L., 1753 | Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet | |
| Plumbaginaceae | <i>Limonium narbonense</i> Mill., 1768 | Statice de Narbonne, Saladelle de Narbonne | |
| Poaceae | <i>Arundo donax</i> L., 1753 | Canne de Provence, Grand roseau | |
| | <i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Brachypode de Phénicie | |
| | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Cynodon dactyle | |
| | <i>Echinochloa crus-galli</i> gpe | | |
| | <i>Elytrigia acuta</i> (DC.) Tzelev, 1973 | Chiendent du littoral | |
| | <i>Oryza sativa</i> L., 1753 | Riz, Riz cultivé | |
| | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804 | Paspale dilaté | |
| | <i>Paspalum distichum</i> L., 1759 | Paspale à deux épis | |
| | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau | |
| | <i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912 | Sétaire verte | |
| | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817 | Sétaire glauque, Sétaire naine | |
| | <i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Sétaire verticillée, Panic verticillé | |
| | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1805 | Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba | |

| | | |
|--------------|---|---|
| Polygonaceae | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | Renouée Persicaire |
| | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse |
| | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | Patience agglomérée, Oseille agglomérée |
| Rosaceae | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | Aigremoine, Francormier |
| | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille |
| | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | Ronce à feuilles d'orme |
| Rubiaceae | <i>Rubia tinctorum</i> L., 1753 | Garance des teinturiers |
| Salicaceae | <i>Populus alba</i> L., 1753 | Peuplier blanc |
| | <i>Salix alba</i> L., 1753 | Saule blanc, Saule commun |
| Solanaceae | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | Morelle noire |
| Tamaricaceae | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | Tamaris de France, Tamaris commun |
| Typhaceae | <i>Typha domingensis</i> Pers., 1807 | Massette de Saint-Domingue |
| Verbenaceae | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale |

Sortie du 13 septembre 2017, Camargue

Canal entre Gallician et le centre du Scamandre

| Famille | Nom scientifique reconnu (TAXREF v7) | Noms vernaculaires (TAXREF v7) |
|------------------|---|--|
| Araceae | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | Spirodèle à plusieurs racines |
| Asteraceae | <i>Sonchus maritimus</i> L., 1759 | Laiteron maritime |
| Brassicaceae | <i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759 | Passerage à feuilles de graminée, Petite passerage |
| Ceratophyllaceae | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | Cornifle nageant, Cornifle immergé |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia hirsuta</i> L., 1759 | Euphorbe hirsute |
| Haloragaceae | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | Myriophylle à épis |
| Iridaceae | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris des marais |
| Lamiaceae | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau |
| | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | Épiaire des marais, Ortie bourbière |
| Lythraceae | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre |
| Nymphaeaceae | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | Nénuphar jaune, Nénufar jaune |
| Onagraceae | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute |
| | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Jussie |
| Poaceae | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791 | Brome faux Uniola, Brome purgatif |
| Potamogetonaceae | <i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816 | Potamot nouveau |
| Primulaceae | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire |
| Rubiaceae | <i>Rubia tinctorum</i> L., 1753 | Garance des teinturiers |