

## Sortie SHNH du 04 avril 2018, La Corniche, Sète

Corniche : exploration côté nord de la route, à l'est et à l'ouest

en vert : plantation

| Famille         | Nom scientifique reconnu (TAXREF v11)                                             | Noms vernaculaires (TAXREF v11)                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Acanthaceae     | <i>Acanthus mollis</i> L., 1753                                                   | Acanthe à feuilles molles, Acanthe molle                             |
| Agavaceae       | <i>Agave americana</i> L., 1753                                                   | Agave d'Amérique                                                     |
|                 | <i>Agave americana marginata</i> L., 1753                                         | Agave d'Amérique                                                     |
| Aizoaceae       | <i>Aptenia cordifolia</i> (L.f.) Schwantes, 1928                                  | Ficoïde glaciale, Baby sun rose, Ficoïde à feuilles en cœur          |
| Amaranthaceae   | <i>Atriplex halimus</i> L., 1753                                                  | Halime, Arroche halime                                               |
|                 | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882                    | Bette maritime                                                       |
|                 | <i>Camphorosma monspeliaca</i> L., 1753                                           | Camphrée                                                             |
|                 | <i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938                                  | Obione faux pourpier, Obione Pourpier                                |
|                 | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791                                     | Soude vraie, Suéda fruticuleux                                       |
| Amaryllidaceae  | <i>Allium neapolitanum</i> Cirillo, 1788                                          | Ail de Naples, Ail blanc                                             |
|                 | <i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult.f., 1830                                | Ail à nombreuses fleurs, Poireau des vignes                          |
| Apiaceae        | <i>Bupleurum fruticosum</i> L., 1753                                              | Buplèvre ligneux, Buplèvre en buisson                                |
|                 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753                                                | Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre              |
|                 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753                                                | Chardon Roland, Panicaud champêtre                                   |
|                 | <i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill., 1768                       | Fenouil                                                              |
|                 | <i>Smyrnium olusatrum</i> L., 1753                                                | Maceron cultivé                                                      |
| Asparagaceae    | <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842                                      | Muscari à grappes, Muscari négligé                                   |
| Asphodelaceae   | <i>Aloe maculata</i> All., 1773                                                   |                                                                      |
|                 | <i>Asphodelus fistulosus</i> L., 1753                                             | Asphodèle fistuleuse, Asphodèle fistuleux                            |
| Asteraceae      | <i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers., 1807                                     | Anacycle en massue, Anacycle tomenteux                               |
|                 | <i>Artemisia caerulescens</i> subsp. <i>gallica</i> (Willd.) K.Pers., 1974        | Armoise bleuâtre de France, Armoise de France                        |
|                 | <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>glutinosa</i> (J.Gay ex Besser) Batt., 1889 | Armoise poisseuse                                                    |
|                 | <i>Calendula arvensis</i> L., 1763                                                | Souci des champs, Gauchefier                                         |
|                 | <i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763                                             | Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses                     |
|                 | <i>Carlina hispanica</i> Lam., 1785                                               | Carline                                                              |
|                 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753                                                 | Chicorée amère, Barbe-de-capucin                                     |
|                 | <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753                                                 | Crépide à feuilles de capselle                                       |
|                 | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913                                            | Crépide de Nîmes                                                     |
|                 | <i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach, 1841                              | Chrysanthème des jardins (= <i>Chrysanthemum coronarium</i> )        |
|                 | <i>Hedypnois rhagadioloide</i> s (L.) F.W.Schmidt, 1795                           | Hedypnois faux rhagadiole, Bonne-nuit-les-petits, Hédipnois de Crète |
|                 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794                                     | Immortelle des dunes, Immortelle jaune                               |
|                 | <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsér & Meijden, 2005                              | Séneçon Cinéraire (= <i>Senecio cineraria</i> )                      |
|                 | <i>Limbarda crithmoides</i> subsp. <i>longifolia</i> (Arcang.) Greuter, 2003      | Inule de la Méditerranée (= <i>Inula chritmoides</i> )               |
|                 | <i>Osteospermum</i> sp.                                                           |                                                                      |
|                 | <i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass., 1825                                          | Pallénis épineux                                                     |
|                 | <i>Phagnalon sordidum</i> (L.) Rchb., 1831                                        | Phagnalon repoussant                                                 |
|                 | <i>Ptilostemon gnaphaloides</i> (Cirillo) Soják, 1962                             |                                                                      |
|                 | <i>Santolina</i> sp.                                                              | Santoline                                                            |
|                 | <i>Scolymus hispanicus</i> L., 1753                                               | Scolyme d'Espagne, Chardon d'Espagne                                 |
|                 | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791                                        | Chardon marie, Chardon marbré                                        |
|                 | <i>Sonchus tenerimus</i> L., 1753                                                 | Laiteron délicat                                                     |
|                 | <i>Tyrimnus leucographus</i> (L.) Cass., 1826                                     | Tyrimne à taches blanches                                            |
|                 | <i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795                     | Urosperme de Daléchamps                                              |
| Boraginaceae    | <i>Echium calycinum</i> Viv., 1804                                                | Vipérine à calice persistant                                         |
|                 | <i>Echium candicans</i> L.f., 1782                                                | Vipérine (= <i>Echium fastuosum</i> )                                |
|                 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753                                                    | Vipérine commune, Vipérine vulgaire                                  |
| Brassicaceae    | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869          | Bourse-à-pasteur rougeâtre                                           |
|                 | <i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC., 1821                                        | Fausse roquette                                                      |
|                 | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821                                       | Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune                                   |
|                 | <i>Lepidium draba</i> L., 1753                                                    | Passerage drave, Pain-blanc                                          |
|                 | <i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815                                        | Lobulaire maritime, Alysse maritime                                  |
|                 | <i>Sisymbrium irio</i> L., 1753                                                   | Vélaret, Sisymbre Irio                                               |
| Cactaceae       | <i>Opuntia engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm., 1850                             |                                                                      |
|                 | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768                                      | Figuier de Barbarie, Figuiers d'Inde                                 |
| Caprifoliaceae  | <i>Lomelosia cretica</i> (L.) Greuter & Burdet                                    | Scabieuse de Crète                                                   |
|                 | <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> (L.) Fiori, 1903                | Scabieuse maritime                                                   |
| Caryophyllaceae | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789                                               | Compagnon blanc, Silène à feuilles larges                            |
|                 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869                                      | Silène enflé, Tapotte                                                |
|                 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789                                           | Mouron des oiseaux, Morgeline                                        |
| Convolvulaceae  | <i>Convolvulus althaeoides</i> L., 1753                                           | Liseron fausse mauve, Liseron fausse Guimauve                        |
|                 | <i>Convolvulus lineatus</i> L., 1759                                              | Liseron à rayures parallèles, Liseron rayé                           |
| Crassulaceae    | <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909                                          | Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice                   |
| Euphorbiaceae   | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753                                             | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès                          |
|                 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753                                             | Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues                             |
|                 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 (s. str.)                                       | Mercuriale annuelle                                                  |
| Fabaceae        | <i>Anthyllis barba-jovis</i> L., 1753                                             | Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter, Anthyllis Barbe-de-Jupiter       |
|                 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981                               | Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux                                   |
|                 | <i>Cercis siliquastrum</i> L., 1753                                               | Arbre de Judée, Gainier commun                                       |
|                 | <i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>pentaphyllum</i> Scop., 1772              | Dorycnie à cinq feuilles                                             |
|                 | <i>Genista monosperma</i> (L.) Lam., 1788                                         |                                                                      |
|                 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762                                          | Luzerne d'Arabie                                                     |
|                 | <i>Medicago arborea</i> L., 1753                                                  | Luzerne en arbre                                                     |
|                 | <i>Medicago rigidula</i> (L.) All., 1785                                          | Luzerne raide                                                        |
| Geraniaceae     | <i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789                                         | Érodium Bec-de-cigogne                                               |
|                 | <i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér., 1789                                       | Érodium Fausse-Mauve, Érodium à feuilles de Mauve                    |
|                 | <i>Geranium molle</i> L., 1753                                                    | Geranium à feuilles molles                                           |
| Lamiaceae       | <i>Ballota</i> sp.                                                                | Ballote                                                              |
|                 | <i>Phlomis fruticosa</i> L., 1753                                                 | Sauge de Jérusalem                                                   |
|                 | <i>Teucrium fruticans</i> L., 1753                                                | Germandrée arbustive                                                 |
| Malvaceae       | <i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel., 1837                                   | Mauve en arbre (= <i>Lavatera arborea</i> )                          |
|                 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753                                                  | Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve                         |
| Oxalidaceae     | <i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753                                                 | Oxalis pied-de-chèvre                                                |
| Papaveraceae    | <i>Fumaria capreolata</i> L., 1753                                                | Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée                             |

| Famille          | Nom scientifique reconnu (TAXREF v11)              | Noms vernaculaires (TAXREF v11)                              |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753                | Fumeterre officinale                                         |
|                  | <i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788               | Fumeterre à petites fleurs                                   |
|                  | <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809            | Fumeterre de Vaillant                                        |
|                  | <i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763                | Glaucière jaune, Pavot jaune des sables                      |
|                  | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753                     | Coquelicot                                                   |
| Phytolaccaceae   | <i>Phytolacca dioica</i> L., 1762                  | Belombra                                                     |
| Pittosporaceae   | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811 | Arbre des Hottentots                                         |
| Plantaginaceae   | <i>Pittosporum truncatum</i>                       |                                                              |
|                  | <i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840          | Muflier des champs, Tête-de-mort                             |
|                  | <i>Plantago afra</i> L., 1762                      | Plantain pucier                                              |
|                  | <i>Plantago lagopus</i> L., 1753                   | Plantain queue de lièvre, Plantain Pied-de-lièvre            |
|                  | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753                | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures                   |
|                  | <i>Veronica cymbalaria</i> Bodard, 1798            | Véronique cymbalaire                                         |
| Plumbaginaceae   | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753               | Véronique à feuilles de lierre                               |
|                  | <i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss., 1848  | Grand stative, Limoniastrum monopétale, Limoniastre          |
| Poaceae          | <i>Anisantha rubens</i> (L.) Nevski, 1934          | Brome rouge                                                  |
|                  | <i>Avena barbata</i> Link subsp. <i>barbata</i>    | Avoine barbue                                                |
|                  | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805           | Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent                      |
|                  | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753                 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule                             |
|                  | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753                    | Orge sauvage, Orge Queue-de-rat                              |
|                  | <i>Lygeum spartum</i> L., 1754                     |                                                              |
|                  | <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990 | Cheveux d'ange                                               |
|                  | <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971       | Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole     |
|                  | <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753                  | Nerprun Alaterne, Alaterne                                   |
| Rhamnaceae       |                                                    |                                                              |
| Rosaceae         | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879       | Cotonéaster horizontal                                       |
| Rubiaceae        | <i>Poterium sanguisorba</i> gpe                    | Sanguisorbe                                                  |
|                  | <i>Galium aparine</i> L., 1753                     | Gaillet gratteron, Herbe collante                            |
|                  | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753                 | Rubéole des champs, Gratteron fleuri                         |
|                  | <i>Valantia muralis</i> L., 1753                   | Vaillantie des murs                                          |
| Scrophulariaceae | <i>Verbascum sinuatum</i> L., 1753                 | Molène sinuée                                                |
| Solanaceae       | <i>Hyoscyamus albus</i> L., 1753                   | Jusquiame blanche                                            |
| Tamaricaceae     | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753                    | Tamaris de France, Tamaris commun                            |
| Urticaceae       | <i>Parietaria judaica</i> L., 1756                 | Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse |
| Zygophyllaceae   | <i>Zygophyllum fabago</i> L., 1753                 | Fabagelle                                                    |

Corniche : exploration côté sud de la route, à l'est et à l'ouest du parking

| Famille         | Nom scientifique reconnu (TAXREF v11)                                       | Noms vernaculaires (TAXREF v11)                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizoaceae       | <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926                                | Ficoïde doux, Griffes de sorcière, Figuier des Hottentots                          |
|                 | <i>Malephora crocea</i> (Jacq.) Schwantes, 1928                             |                                                                                    |
|                 | <i>Malephora lutea</i> Schwantes                                            |                                                                                    |
|                 |                                                                             |                                                                                    |
| Amaranthaceae   | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882              | Bette maritime                                                                     |
|                 | <i>Camphorosma monspeliaca</i> L., 1753                                     | Camphrée                                                                           |
|                 | <i>Chenopodium murale</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012             | Chénopode des murs                                                                 |
|                 | <i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938                            | Obione faux pourpier, Obione Pourpier                                              |
|                 | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791                               | Soude vraie, Suéda fruticuleux                                                     |
|                 |                                                                             |                                                                                    |
| Apiaceae        | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753                                          | Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre                            |
| Apocynaceae     | <i>Vinca major</i> L., 1753                                                 | Grande pervenche                                                                   |
| Asteraceae      | <i>Anthemis maritima</i> L., 1753                                           | Anthémis maritime, Camomille maritime                                              |
|                 | <i>Artemisia caerulescens</i> subsp. <i>gallica</i> (Willd.) K.Perss., 1974 | Armoise bleuâtre de France, Armoise de France                                      |
|                 | <i>Filago pygmaea</i> L., 1753                                              | Cotonnière naine (plante vue par J.-R. Garcia et Justin après le départ du groupe) |
|                 | <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden, 2005                        | Séneçon Cinéraire                                                                  |
|                 | <i>Scolymus hispanicus</i> L., 1753                                         | Scolyme d'Espagne, Chardon d'Espagne                                               |
|                 | <i>Tyrimnus leucographus</i> (L.) Cass., 1826                               | Tyrimne à taches blanches                                                          |
|                 |                                                                             |                                                                                    |
| Boraginaceae    | <i>Echium calycinum</i> Viv., 1804                                          | Vipérine à calice persistant                                                       |
| Brassicaceae    | <i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815                                  | Lobulaire maritime, Alysse maritime                                                |
|                 | <i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br., 1812                                    | Giroflée violet, Violier                                                           |
|                 | <i>Sisymbrium irio</i> L., 1753                                             | Vélaret, Sisymbre Irio                                                             |
| Cactaceae       | <i>Opuntia engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm., 1850                       |                                                                                    |
|                 | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768                                | Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde                                                |
|                 |                                                                             |                                                                                    |
| Caryophyllaceae | <i>Sagina apetala</i> Ard., 1763                                            | Sagine apétale, Sagine sans pétales                                                |
| Convolvulaceae  | <i>Convolvulus lineatus</i> L., 1759                                        | Liseron à rayures parallèles, Liseron rayé                                         |
| Cucurbitaceae   | <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich., 1824                               | Concombre d'âne, Momordique, Concombre sauvage                                     |
| Ephedraceae     | <i>Ephedra distachya</i> L., 1753                                           | Éphédre à chatons opposés, Éphédre de Suisse, Raisin-de-mer                        |
| Fabaceae        | <i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser., 1825                                   | Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute                                                |
| Frankeniaceae   | <i>Frankenia hirsuta</i> L., 1753                                           | Frankénie hirsute                                                                  |
| Malvaceae       | <i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel., 1837                             | Mauve en arbre                                                                     |
| Oxalidaceae     | <i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798                                      | Oxalis articulé                                                                    |
| Plantaginaceae  | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753                                          | Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau                    |
|                 | <i>Plantago lagopus</i> L., 1753                                            | Plantain queue de lièvre, Plantain Pied-de-lièvre                                  |
|                 |                                                                             |                                                                                    |
| Plumbaginaceae  | <i>Limonium duriusculum</i> (Girard) Fourr., 1869                           | Statice dure, Limonium dur                                                         |
| Poaceae         | <i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr., 1869                              | Statice raide, Limonium en baguette                                                |
|                 | <i>Lagurus ovatus</i> L., 1753                                              | Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet                                                 |
|                 | <i>Sporobolus pungens</i> (Schreb.) Kunth, 1829                             | Sporobole piquant                                                                  |
| Smilacaceae     | <i>Smilax aspera</i> L., 1753                                               | Salsepareille, Liseron épineux                                                     |
| Solanaceae      | <i>Hyoscyamus albus</i> L., 1753                                            | Jusquiame blanche                                                                  |
| Zygophyllaceae  | <i>Zygophyllum fabago</i> L., 1753                                          | Fabagelle                                                                          |

Corniche : exploration côté nord de la route, face au parking du théâtre de la mer

| Famille       | Nom scientifique reconnu (TAXREF v11)                 | Noms vernaculaires (TAXREF v11)                |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aizoaceae     | <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L., 1753         | Ficoïde à cristaux, Mésembryanthème à cristaux |
| Asteraceae    | <i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter, 1997           | Astérolide maritime                            |
| Brassicaceae  | <i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br., 1812              | Giroflée violet, Violier                       |
| Cactaceae     | <i>Opuntia engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm., 1850 |                                                |
|               | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768          | Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde            |
| Cucurbitaceae | <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich., 1824         | Concombre d'âne, Momordique, Concombre sauvage |
| Frankeniaceae | <i>Frankenia hirsuta</i> L., 1753                     | Frankénie hirsute                              |
| Oxalidaceae   | <i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798                | Oxalis articulé                                |