

Bloc-note oiseaux n° 2

Sortie du 28 février 2021 aux étangs

Dans le site naturel protégé du Méjean de Lattes, nombreux sont les visiteurs à lever la tête en entendant craqueter les **cigognes blanches** (*Ciconia ciconia*) dont les nids, tant artificiels que naturels, sont tous occupés. Quelques visiteurs ont eu la chance de saisir l'instant fugace d'un accouplement avec leur smartphone. Au passage, un **rougegorge familial** (*Erithacus rubecula*) semble nous faire des courbettes. Le long de la roubine éclate le chant sonore du mâle cantonné de la **bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*), bien caché dans les ronciers. Dans la sansouïre jaillit la clameur trahissant la présence d'un **râle d'eau** (*Rallus aquaticus*).

Un couple de **tadornes de Belon** (*Tadorna tadorna*), dont le mâle se distingue aisément au tubercule rouge ornant son bec, évolue en toute quiétude dans une petite pièce d'eau. Dans la phragmitaie en bordure des anciens bassins de décantation sont perchés quelques **bruants des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*). Une **poule-d'eau** (*Gallinula chloropus*) laisse derrière elle un sillage argenté sur le miroir de l'eau. Une **foulque macroule** (*Fulicula atra*) procède en toute quiétude à sa toilette, ignorant le photographe équipé d'un gros téléobjectif qui attend patiemment de faire la photo du siècle. Trois **tortues de Floride** (*Trachemys scripta*) prennent un bain de soleil. Cette espèce invasive est piégée en grand nombre par les gardes du littoral. Plus loin, c'est un **grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) qui plonge et refait surface à plusieurs reprises sous l'œil d'un **chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) solitaire qui semble fiché dans la vasière. Se repose-t-il ou guette-t-il une proie ?

Comme les années précédentes, deux colonies de **hérons cendrés** (*Ardea cinerea*), soit plus de vingt couples, se sont installées sur des grands frênes. Les silhouettes floues d'une **grande aigrette** (*Egretta alba*) et d'un couple de **cygnes tuberculés** (*Cygnus olor*) transparaissent au travers du rideau de branches des tamaris dans lesquelles se déplacent furtivement un **pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) Un petit groupe de onze **sarcelles d'hiver** (*Anas crecca*) amérit en silence à côté d'un important groupe de **mouettes rieuses** (*Chroicocephalus ridubundus*) et de **goélands leucophées** (*Larus michaelis*) Nombre de ces laridés sillonnent en criant le ciel où l'œil exercé du naturaliste repère un vol de dix-huit **canards souchets** (*Anas clypeata*) au bec élargi à son extrémité. Un **busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) plane, les ailes relevées en V. Son plumage le désigne comme étant une femelle, mais il existe des mâles possédant un phénotype ressemblant à celui de ces dernières.

Sur l'étang du Méjean évoluent des **grèbes huppés** (*Podiceps cristatus*) au milieu de plusieurs centaines de **flamants roses** (*Phoenicopterus roseus*). Un petit nombre d'entre eux parade bruyamment à proximité d'un groupe de **grands cormorans** (*Phalacrocorax carbo*) impassibles,. Au retour, l'examen des photos montrera qu'un flamant rose était porteur d'une bague. Les renseignements fournis par la Tour du Valat nous ont appris que cet individu avait été bagué le 20/04/1994 dans la colonie de l'étang du Fangassier ¹. Il a donc parcouru 1918 kilomètres en 27 ans, visitant régulièrement les étangs et salines du Gard, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône. Il a même été noté une fois en Sardaigne.

Dans l'après-midi, une escapade dans le secteur des cabanes du Salaison à Mauguio m'a permis, d'observer, entre autres, un **tarier pâtre** (*Saxicola rubicola*) perché au sommet d'un piquet et quelques **avocettes élégantes** (*Recuvirostra avosetta*) sabrant l'eau de leur bec recourbé à la recherche de nourriture. Pendant mon retour, trois oiseaux sombres au long bec arqué, dont la silhouette rappelle celle des courlis, ont volé juste au-dessus de ma tête et se sont posés en douceur dans les salicornes. C'étaient des **ibis falcinelles** (*Plegadis falcinellus*) dont le plumage est irisé de

1 Situé dans le Parc naturel régional de Camargue, c'est le seul site français de reproduction de cette espèce.

vert sombre et de reflets cuivrés ou bronzés par le soleil du soir. Beau spectacle pour terminer cette sortie !

Album photographique

Crédit photo : Aude Derouane : AD, Élise Derouane : ED, J.-Paul Marger : JPM



Figure 1 : Une cigogne craquète (AD)



Figure 2 : Un accouplement (ED)




Figure 3 : Vue de la colonie des cigonez (ED)



Figure 4 : Foulque macroule (ED)



Figure 5 : Aigrette garzette (JPM)



Figure 6 : Héron cendré (JPM)




Figure 7 : couple de Tadornes de Belon (ED)



Figure 8 : Bruant des roseaux (AD)



Figure 9 : Chevalier guignette (JPM)



Figure 10 : Râle d'eau (JPM)




Figure 11 : Grande aigrette (AD)



Figure 10 : l'arbre aux Hérons cendrés (AD)



Figure 13 : Flamant rose bagué (AD)



Figure 14 : Flamants roses en parade (AD)

Les oiseaux de la mangeoire

Crédit photo : Martine Bénézech

Pour compléter ce bloc-note, voici deux photos prises par l'une de nos adhérentes demeurant à Soubès, près de Lodève.

Les **chardonnerets élégants** (*Carduelis carduelis*), fidèles au poste, sont toujours aussi querelleurs. On dit de la **sittelle torchepot** (*Sitta europea*) qu'elle apprécie les graines de tournesol dont elle fait des réserves.



Chardonnerets et Mésange charbonnière



Sittelle torchepot