

SMD 3552

Pluteus hongoi

(Plutée de Hongo)

Syn. *Pluteus albineus*

ABC Saint Michel de Dèze, 28 juin 2020, D54 au km 3.3. Sur une souche coupée, probablement de châtaignier.



Champignon voisin de *Pluteus cervinus*, en plus pâle, sans mèches brunes.

Description macroscopique du spécimen

Chapeau 6 cm blanc, soyeux, centre ocre.

Lames roses,

Pied blanc clavé.

Odeur fongique, herbacée.


Description microscopique du spécimen

Spores 8*6 µm, lisses.

Hyphes à pigment incrustant.

Pleurocystides à crochets, parois 1 à 2 µm.

Pas de boucle dans la cuticule



Commentaires

Pluteus hongoi (en honneur du mycologue japonais T. Hongo), est décrite en 1989 par Singer, sur des récoltes faites au Japon, mais il est aussi présent en Amérique, en Sibérie et en Europe, où il a aussi été quelquefois appelé *Pluteus albineus*.

D'après les études phylogénétiques (Justo & al. 2014), *P. hongoi* appartient au même clade que *P. cervinus*, qui est en fait un groupe de plusieurs espèces souvent confondues.

Abréviations et références

ABC = Atlas de la Biodiversité Communale

- A. Justo, E. Malisheva & al., «Holarctic species of *Pluteus* », *Phytotaxa*, 180 (2014).