

Arp3368

Cortinarius talus
= *Thaxterogaster talus*

Synonymes : *C. aurantionapus*, *C. crenulatus*, *C. ochropudorinus*, *C. pseudominor* et *C. pseudotalus*

Synonyme probable *C. ochropallidus*

ABC Arphy, 19 septembre 2018
Valat de l'Abreuvoir



Espèce ocre pâle, givrée chez les jeunes spécimens,
à pied bulbeux et odeur de miel.
Associé aux hêtres, en montagne.
Espèce assez variable.

Description macroscopique du spécimen

Chapeau 9 cm, ocre-roux visqueux, centre givré.

Lames ocres-jaune, puis rousses, arête denticulée.


Pied diamètre 10 mm, jaune-clair brillant, bulbeux peu marginé, bulbe blanc.

Chair blanche, odeur miel aigre.

KOH brun-acajou sur la cuticule, brun sur la chair, nulle dans le bulbe.

Description microscopique du spécimen

Spores $7.7 \times 4.9 \mu\text{m}$ $Q= 1.58$, amygdaliformes pontillées, points à peine visible.



Commentaires

Appartient à la douzaine d'espèce de la section *Multiformes*, dont les caractères morphologiques ne permettent pas toujours une identification facile (Brandrud & al. 2014, Liimatainen & al. 2014), malgré leur fréquente odeur de miel.

En 2022 et sur des bases génétiques, Liimatainen et al. ont déplacé cette espèce ainsi que toute la section dans le genre *Thaxterogaster*.

Les spécimens de la photo sont typiques, et grâce à l'habitat, devraient aider à la reconnaissance des futures récoltes.

Abréviations et références

ABC = Atlas de la Biodiversité Communale

- T. Brandrud, B. Dima & al, « Cortinarius subgenus Phlegmacium section Multiformes in Europe », Journal des JEC 16, p 162-199, (2014)
- K. Liimatainen¹, T. Niskanen¹ & al. «The largest type study of Agaricales species to date: bringing identification and nomenclature of Phlegmacium into the DNA era » Persoonia 33, 98–140 (2014)
- K. Liimatainen, J. Kim & al, « Taming the beast: a revised classification of Cortinariaceae based on genomic data », Fungal Diversity 112, pp 89–170 (2022).



Rédaction

Gérard Lévêque

Révision Jean-
Michel Bellanger

oct. 2024