




Compte rendu de la sortie SHHNH du 29/03/2026 : La flore printanière de l'Aigoual (30)

Andrieu F.



Cartes topographique et géologique avec les zones d'herborisation
(source : <https://www.geoportail.gouv.fr/> et <http://infoterre.brgm.fr/>)

Formations superficielles (ère Quaternaire)

FT	Alluvions fluviales
FP	Formations fluviales des plateaux
R	Formations résiduelles "Terre du Causse"

Trias et Lias (début de l'ère Secondaire)

J8	Calcaires
J7	Calcaires et calcaires marneux
J6	Calcaires
J3-5	Marnes et calcaires marneux

J2b	Dolomies
J2a	Calcaires
I1-2	Dolomies et calcaires
t10-l1	Dolomies et calcaires
t	Terrains sédimentaires post-hercyniens du Trias, grès et poudingues

Socle (ère Primaire)

γ	Granite
---	---------

À ces altitudes supérieures à 1 000 m, la flore printanière est encore très discrète en mars. Elle l'est d'autant plus, que ce début de saison, froid et particulièrement pluvieux, a retardé les floraisons sur les crêtes par rapport à nos prévisions. Notons au passage que cette humidité de début d'année, exceptionnelle dans certains secteurs, a contrasté fortement avec la sécheresse qui s'est manifestée par la suite.

Pour pallier la rareté des fleurettes, l'improvisation et l'itinérance ont été de mise pour aller glaner les objets de notre quête. Quatre arrêts ont ainsi été réalisés :

1. Le col de Faubelle : ce premier arrêt à 1286 m se trouve à l'ouest de l'Espérou. On se trouve là au niveau de l'imposant affleurement de granite du Saint-Guiral, à l'ouest du massif de l'Aigoual. C'est une vieille surface du Primaire, recouverte sur son flanc nord par des grès attribués au Trias. L'ambiance est forestière, avec des hêtraies et des anciennes plantations de conifères, des lambeaux de landes et des pelouses sur les crêtes. La végétation est clairement acidiphile, en lien avec la nature du substrat ;
2. La perte du Bonheur : ce secteur marque la transition entre le socle magmatique et métamorphique du massif de l'Aigoual, et la couverture sédimentaire du Secondaire des grands Causses. Dans la vallée du Bonheur, le socle de granites et schistes est recouvert par des formations fluviatiles du quaternaire dans sa partie amont, et des calcaires du Trias et du Lias (Jurassique inférieur) au niveau de sa perte à l'aval. Ces derniers sont sans continuité avec les calcaires du Jurassique supérieur qui leur font face sur le Causse Noir plus à l'ouest. Cela s'explique par l'existence d'une faille majeure orientée nord-sud, entre le socle cristallin des Cévennes et les plateaux sédimentaires des Causses. Ce dernier compartiment a subi un affaissement lors du plissement des Pyrénées puis des Alpes à l'ère Tertiaire, si bien que les couches du Trias et du Lias sont situées bien plus bas et n'affleurent qu'en fond de gorges bien plus à l'ouest. La végétation qui se développe ici rappelle celle des causses voisins, avec des pelouses steppiques calcaires typiques, des fruticées et des fragments de Chênaie pubescente.
3. Le Causse Noir aux Mazes, vers la grotte de Dargilan : le paysage est caractéristique des causses. Sa topographie présente de grands ondulations mais reste globalement plane. Le substrat est calcaire à marneux dans le secteur visité, et vire aux dolomies plus au sud. La végétation est marquée par les anciens parcours à mouton que sont les pelouses steppiques, et comprend aussi des fruticées, des faciès d'embuissonnement, des bois de Chêne pubescent et de Pin sylvestre, et des cultures de céréales.
4. La vallée de la Dourbie aux Laupies : pour ce dernier arrêt, retour sur le massif granitique du Lingas pour herboriser dans des pelouses ou prairies de fond de vallée, et compléter les observations dans les bois le long du cours de la Dourbie.

Liste des espèces observées

1. Hêtraie, lisière et lande à genêt au col de Faubelle et sur la crête à l'ouest (communes de Saint-Sauveur-Camprieu et Dourbies)

<i>Abies alba</i> Mill.	<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> (Huds.) Gaudin
<i>Anemone nemorosa</i> L.	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz (= <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.)
<i>Anthoxanthum odoratum</i> subsp. <i>odoratum</i> L.	<i>Patzkea paniculata</i> (L.) G.H. Loos (= <i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.)
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer (= <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.)	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	<i>Pinus sylvestris</i> L.
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	<i>Ranunculus auricomus</i> s. l.
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	<i>Rumex acetosella</i> L.
<i>Crocus vernus</i> (L.) Hill	<i>Scilla bifolia</i> L.
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Peñas	<i>Stellaria holostea</i> L. (= <i>Rubra holostea</i> (L.) M.T. Sharples & E.A. Tripp)
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.
<i>Fagus sylvatica</i> L.	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	
<i>Geum urbanum</i> L.	
<i>Juniperus communis</i> var. <i>communis</i> L.	
<i>Luzula nivea</i> (Nath.) DC.	

2. Pelouses calcaires, ourlets, rochers calcaires, bord de rivière à la Perte du Bonheur (commune de Saint-Privat)

<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	Reichst.
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (Christ) Lovis &	<i>Bellis perennis</i> L.

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.
Buxus sempervirens L.
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia L.
Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All.
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Colchicum autumnale L.
Corylus avellana L.
Crocus vernus (L.) Hill
Draba verna L. (= Erophila verna (L.) Chevall.)
Euphorbia cyparissias L.
Gentiana cruciata L.
Helleborus foetidus L.
Hepatica nobilis Schreb. (= Anemone hepatica L.)

Hypochaeris radicata L.
Luzula campestris (L.) DC.
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus L.
Plantago lanceolata L.
Primula veris var. columnae (Ten.) B. Bock
Prunus spinosa L.
Pulsatilla x bogenhardiana Rchb.
Sambucus nigra L.
Urtica dioica L.
Valeriana tripteris L.
Veronica hederifolia subsp. hederifolia L.
Viola odorata L.

3. Pelouse steppique et fruticées au nord-est du hameau des Mazes (commune du Lanuéjols)

Adonis vernalis L.
Bromus erectus Huds. (= Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.)
Eryngium campestre L.
Euphorbia cyparissias L.
Genista hispanica subsp. hispanica L.
Genista pilosa subsp. pilosa L.
Juniperus communis var. communis L.
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.
Muscari neglectum Guss. ex Ten. & Sangiov.

Ononis striata Gouan
Onosma tricosperma subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G. López
Pinus sylvestris L.
Potentilla verna L. (= P. tabernaemontani Asch.)
Ribes uva-crispa L.
Taraxacum sect. Erythrosperma (H. Lindb.) D
Teucrium chamaedrys L.

4. Pelouses sèche et fraîche, fourrés de genêts, bois en bord de rivière (commune de Les Laupies)

Achillea millefolium L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Anemone nemorosa L.
Aquilegia vulgaris L.
Armeria arenaria (Pers.) Schult.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
Cardamine hirsuta L.
Cerastium ramosissimum Boiss.
Chelidonium majus L.
Colchicum autumnale L.
Corydalis solida (L.) Clairv.
Corylus avellana L.
Crocus vernus (L.) Hill
Cruciata laevipes Opiz
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Peñas
Cytisus scoparius (L.) Link
Draba verna L. (= Erophila verna (L.) Chevall.)
Erodium cicutarium var. cicutarium (L.) L'Hér.
Fagus sylvatica L.
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.
Ficaria grandiflora Robert
Fraxinus excelsior L.
Geum urbanum L.
Hypochaeris radicata L.
Jasione montana L.
Juncus effusus L.

Lamium purpureum var. purpureum L.
Logfia minima (Sm.) Dumort. (= Filago minima (Sm))
Luzula campestris (L.) DC.
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus L.
Ornithogalum kochii Parl.
Ornithopus perpusillus L.
Patzkea paniculata (L.) G.H. Loos (= Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.)
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. (= Hieracium pilosella L.)
Plantago lanceolata L.
Poa bulbosa L.
Potentilla neglecta Baumg.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus monspeliacus L.
Rumex acetosa subsp. acetosa L.
Rumex acetosella L.
Salix purpurea L.
Saxifraga granulata L.
Sedum hirsutum All.
Senecio vulgaris subsp. vulgaris L.
Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke
Stellaria holostea L. (= Rabelera holostea (L.) M.T. Sharples & E.A. Tripp)
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T. Aiton
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.
Urtica dioica L.



Narcissus pseudonarcissus [FA]



Colchicum autumnale [FA]



Adonis vernalis [FA]



Rives uva-crispa, un sujet particulièrement épineux [FA]



Cerastium ramosissimum, avec des sépales pourvus seulement de poils glanduleux [FA]



Ficaria grandiflora [FA]



Anemone nemorosa [FA]



Corydalis solida FA



Système racinaire d'un hêtre s'accrochant aux rochers bordant la Dourbie [FA]



Stellaria holostea, jeune pousse [FA]



Saxifraga granulata [FA]



Fraxinus excelsior [FA]



Salix purpurea, noter les bourgeons opposés [FA]



Fagus sylvatica, bourgeon allongé et pointu [FA]



Alnus glutinosa, bourgeon typiquement pédonculé [FA]



Il ne faisait pas très chaud ce jour-là... [FA]

Crédit photo : FA : Frédéric Andrieu